

# Penetro<sup>®</sup>

## Inalante

Eucaliptol 33mg/mL - Terpina Monoidratada 22mg/mL – Mentol 22mg/mL

### Descongestionante das vias aéreas superiores

Formas farmacêuticas, vias de administração e apresentações comercializadas.  
Inalante. Solução para inalação. Frasco contendo 45 mL

### Uso pediátrico e adulto.

**Composição:** Cada 5 mL contém: Eucaliptol 165,0 mg; Terpina Monoidratada 110,0 mg; Mentol 110,0 mg. Veículo q.s.p. 5 mL. Veículo: Ácido benzóico, Álcool etílico, Propilenoglicol, Nonoxinol 9 e Água deionizada.

**Conteúdo:** 45 mL.

**Ação do medicamento:** Promove o descongestionamento das vias aéreas superiores e inferiores. A ação do produto é imediata.

**Indicações do medicamento:** Penetro<sup>®</sup> Inalante está indicado nos casos de congestão nasal e obstrução nasal.

### Riscos do medicamento:

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias. Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis. Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. A utilização do produto é por inalação. Portanto, não deve ser ingerido.

### Interações medicamentosas:

O produto age nas vias aéreas e não é absorvido. Portanto, não apresenta interações medicamentosas. O produto é isento de aminas simpaticomiméticas, ou seja, não tem derivados de adrenalina. Pode ser utilizado em pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, cardiopatias e ou arritmias cardíacas.

### Modo de uso:

**Inalação:** com o devido cuidado, colocar água fervendo em um copo ou xícara (150 mL). Em seguida adicionar uma colher das de chá (5 mL) de Penetro<sup>®</sup> Inalante. Misturar e adaptar o funil inalador no copo ou na xícara e inalar os vapores descongestionantes. Recomenda-se fazer 3 (três) inalações por dia.

**Nebulização:** Adultos e crianças acima de 12 anos: no máximo 10 gotas em 5 mL de água destilada ou soro fisiológico, iniciando com a metade da dose. Fazer até 3 nebulizações ao dia.

Crianças abaixo de 12 anos: no máximo 5 gotas em 5 mL de água destilada ou soro fisiológico, iniciando com a metade da dose. Fazer até 3 nebulizações ao dia.

**Advertências:** Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

**Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:** Não há contra-indicação relativa a faixas etárias. Não existem restrições na administração do produto a pacientes com mais de 65 anos de idade.

**Reações adversas a medicamentos:** Por ser um produto de ação especificamente local, ainda não foi registrada nenhuma reação adversa.

**Superdose:** Em caso de superdose o paciente sentirá a sensação de ardência pela elevada concentração do produto. O tratamento é apenas sintomático. O paciente deve dirigir-se ao posto médico para realizar os procedimentos gerais e tratamento oral de suporte.

**Armazenagem:** O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15°C – 30°C) em local protegido da luz e calor.

**“Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica”.**

**“Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento”.**

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.**

**“Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico”.**

M.S: 1.0143.0027

Farm. Resp.: Alberto R. V. Stein - CRF-RJ 3257

**Laboratório Daudt Oliveira Ltda.**

Rua Simões da Mota, 57 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.026.055/0001-20 - **Indústria Brasileira**

