

# METIOCOLIN B12



**Racemetonina, cloreto de colina, inositol, cianocobalamina**

**FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÃO METIOCOLIN B12** (racemetonina, cloreto de colina, inositol e cianocobalamina) drágeas - embalagens com 40 drágeas.

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada drágea contém 100 mg de racemetonina, 25 mg de cloreto de colina, 50 mg de inositol e 2 mcg de cianocobalamina.

Excipientes: ácido algínico, ácido esteárico, amido de milho, dióxido de silício coloidal, gelatina, polissorbato 80, água deionizada, polividona, álcool etílico, óleo de ricino, carbonato de cálcio, sacarose, dióxido de titânio, talco, celulose, polietilenoglicol, cera amarela de carnaúba, cera branca de abelhas, manitol, goma laca, corante.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Este medicamento deve ser armazenado ao abrigo da luz, calor e umidade. O prazo de validade está indicado na embalagem do produto. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Em alguns casos, os sinais de melhora já são notados no início do tratamento; em outros casos, é necessário um tempo maior para obter-se os efeitos desejados. Não é recomendado o uso deste medicamento no primeiro trimestre da gravidez; se necessário o uso neste período, deverá ser feito sob orientação médica. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. A interrupção repentina do tratamento com este medicamento não causa efeitos desagradáveis, apenas cessará o efeito terapêutico.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Ocasionalmente pode ocorrer mal-estar do estômago, e, por esta razão, este medicamento não deve ser ingerido com o estômago vazio.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As substâncias ativas do Metiocolin B12 (racemetonina, cloreto de colina, inositol e cianocobalamina) são tradicionalmente utilizadas no tratamento de diversas hepatopatias. Suas ações se completam, proporcionando melhores condições para recuperação da célula hepática lesada ou suprimindo as necessidades do organismo, evitando distúrbios funcionais hepáticos. A racemetonina é um aminoácido essencial com atividade lipotrópica. Como substância doadora de radicais metil, permite a formação de colina a partir da etanolamina. Previne a infiltração gordurosa do fígado ao favorecer a biossíntese dos fosfolípidios. A metionina é inicialmente convertida no fígado em seu metabólito principal, a S-adenosil metionina (SAM), precursor do Glutaton, considerado o hepatoprotetor natural mais importante.

A colina, considerada nutriente essencial,

é um amônio quaternário com ação hepatoprotetora e parassimpaticomimética (secundária). Sua principal ação é prevenir a infiltração gordurosa do fígado ao favorecer a biossíntese dos fosfolípidos. Além disso, é um doador de radicais metil que favorece a formação da metionina a partir da homocisteína. Secundariamente, é precursor da acetilcolina.

O inositol pertence à classe química do ciclo-hexanol tendo ações hepatoprotetoras lipotrópicas pois favorece o crescimento celular por mecanismo ainda não esclarecido.

A cianocobalamina (vitamina B12) participa da síntese e transporte dos grupos metil lábeis, indispensáveis à síntese de aminoácidos essenciais, como metionina, colina e tiamina.

## **INDICAÇÕES**

Medicamento hepatoprotetor.

## **CONTRA-INDICAÇÕES**

PORTADORES DE PATOLOGIAS HEPÁTICAS GRAVES E PACIENTES SENSÍVEIS A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO.

## **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

O USO PROLONGADO DA METIONINA EM CRIANÇAS PODE RESULTAR EM GANHO PONDERAL ABAIXO DO NORMAL. PORTANTO, DEVE SER MANTIDO UM ADEQUADO APORTE DE PROTEÍNA DURANTE O USO DESTE MEDICAMENTO. O PRODUTO NÃO DEVE SER INGERIDO EM JEJUM POIS OCASIONALMENTE PODEM OCORRER DISTÚRBIOS GÁSTRICOS.

**GRAVIDEZ:** A SEGURANÇA DO USO

DO PRODUTO DURANTE A GRAVIDEZ NÃO FOI ESTABELECIDADA. POR ESTA RAZÃO, NÃO É RECOMENDADA SUA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO.

## **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

ATÉ O MOMENTO NÃO FORAM RELATADAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM O USO DESTE MEDICAMENTO.

## **REAÇÕES ADVERSAS**

ESTE PRODUTO APRESENTA UM BAIXO ÍNDICE DE REAÇÕES ADVERSAS; RAROS DISTÚRBIOS GÁSTRICOS COMO NÁUSEA E PIROSE TÊM SIDO RELATADOS. RECOMENDA-SE NÃO INGERIR O PRODUTO COM ESTÔMAGO VAZIO.

## **POSOLOGIA**

Crianças: 2 a 3 drágeas ao dia, a critério médico.

Adultos: 4 a 6 drágeas ao dia, a critério médico.

## **SUPERDOSAGEM**

Devem ser adotadas medidas habituais para remoção do material não absorvido pelo trato digestivo, monitorização clínica e medidas de suporte.

## **Pacientes Idosos**

Este medicamento pode ser utilizado em pacientes acima de 65 anos de idade, desde que observadas as contra-indicações, precauções, interações medicamentosas e reações adversas deste medicamento.

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: ver cartucho. Ind. Bras. - Reg. MS nº 1.0394.0479  
Farm. Resp.: J.G. Rocha CRF/SP nº 4067 - CNPJ 61.150.819/0001-20

