

As infecções que necessitam monitorização e tratamento com antibióticos, a paciente deve ter cuidadosamente monitorizada. Deve-se ter em consideração que estas condições podem ocorrer ou ser agravadas durante o tratamento com râncos de manha (vide, abaixo).

- hipertensão arterial sistêmica ou arterial endovenoso muscular;
- enxaqueca ou duração de mais de 1 hora;
- coletânea ou do tipo eritematoso sistêmico;
- história de hipersensibilidade endovenosa (vide abôvho);

O tratamento deve ser descontinuado no caso de descoberta de alguma contraindicação e nas seguintes condições:

- asma;
- para interrupção imediata do tratamento

aumento significativo da pressão arterial; ataque de dor de cabeça do tipo enxaqueca pela primeira vez;

Hiperplasia endometrial - Para prevenir a estimulação endometrial, a dose diária não deverá exceder uma aplicação e nem essa dose máxima deverá ser empregada por mais de algumas semanas.

câncer de mama - Um estudo randomizado controlado com placebo, o estudo Women's Health Initiative (WHI), e estudos epidemiológicos, incluindo o estudo Million Women Study (MWS), relataram um risco aumentado de

T_H por diversos anos (vide Reações adversas). Para toda T_H, um risco excessivo torna-se aparente dentro de poucos anos de uso, aumenta com a duração da administração, mas reforma à medida que é administrada.

RESUMO No estudo MWS, o risco relativo de câncer de mama em mulheres com estradiol equinino consumidores (FFEC) ou estradiol

(E2) maior quando um progestagênio foi adicionado, tanto sequencialmente quanto continuamente, sem considerar o tipo de progestagênio. Não houve evidências de diferença no risco entre as diferentes rotas de

No estudo WHI, o uso contínuo de produto contendo estrogênio equíno combinado a acetato de progestina foi associado com maior risco de câncer de mama e menor risco de infarto agudo do miocárdio. O estudo POPULATION mostrou metade da mortalidade nos infartos fetais locais comum frequentemente ao placebo.

cardiovascular. Podendo, incerto se estes achados também se estendem aos demolidores de THI.

WHI de risco aumentado de provável demência em mulheres que iniciaram o uso contínuo combinado de EEC e MPA após os 65 anos de idade. É reconhecido se estes achados se aplicam a mulheres pós-menopausadas

No caso de infecções vaginais, é recomendado tratamento específico concomitante. Sabe-se que o estriol é excretado no leite materno, podendo diminuir a produção de leite.

Pacientes portadores das seguintes condições deverão ser monitorados: insuficiência cardíaca latente ou manifesta, mastopatia fibroclística, porfiria, hiperlipoproteinemia, história de prurido, herpes gestacional.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista

LACTACOAM - Este medicamento é contraindicado durante o tratamento com estrógeno e lactação. Caso ocorra gravidez, o uso deve ser interrompido imediatamente. Os resultados dos exames de gravidez devem ser informados ao seu médico.

epidemiológicos relevantes mais atuais em relação à exposição fetal inadvertida aos estrogénios não indicaram efeitos teratogênicos ou fetotóxicos.