

Tobracin-D Colírio e pomada oftálmica

Tobramicina

Dexametasona

Antiinfecçioso e antiinflamatório hormonal

Uso adulto e pediátrico

Composição

	Suspensão oftálmica	Pomada oftálmica
Tobramicina	3 mg	3mg
Dexametasona	1 mg	1 mg
Excipiente estéril	q.s.p. 1 ml	q.s.p. 1 g
conservante	Cloreto de benzalcônio 0,01%	Clorobutanol 0,5%

Informação técnica

A dexametasona é um potente antiinflamatório esteroidal responsável pela modulação da resposta inflamatória do olho e seus anexos. A tobramicina une-se aos ribossomos bacterianos e interfere com o complexo de iniciação entre mRNA e a subunidade 30S. O DNA transcreve-se de forma incorreta e produzem-se proteínas não-funcionais, o que culmina em morte celular bacteriana.

Indicações

Nas condições inflamatórias oculares sensíveis a esteróides e onde existe infecção bacteriana ou risco de infecção.

TOBRACIN-D (tobramicina e dexametasona) é indicado também na uveíte anterior crônica e traumas corneanos causados por queimaduras químicas, térmicas ou por radiação ou penetração de corpos estranhos.

Contra-indicações

Contra-indicado na ceratite epitelial por herpes simples (ceratite dendrítica), vacínia, varicela e outras doenças virais da córnea e da conjuntiva. Infecções oculares por micobactérias. Doenças micóticas do olho. Hipersensibilidade aos componentes do produto.

Reações adversas

Prurido e inchaço das pálpebras e eritema conjuntival. Elevação da pressão intra-ocular.

Posologia

Colírio:

1 ou 2 gotas instiladas no saco conjuntival a cada 4 a 6 horas.

Durante as primeiras 24 a 48 horas, a dose pode ser aumentada para 1 ou 2 gotas a cada 2 horas.

Pomada Oftálmica:

Aplicar uma pequena quantidade (1,5 cm) no saco conjuntival 3 ou 4 vezes por dia.

Apresentação

Suspensão oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml

Pomada oftálmica estéril - bisnaga com bico oftálmico contendo 3,5 g

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Tobracin-D (tobramicina e dexametasona): Reg. M.S. 1.1725.0015.003-5 = colírio 5 ml e Reg. M.S. 1.1725.0015.002-7 = pomada 3,5 g

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322