

B -Tablock Colírio

Cloridrato de levobunolol

Antiglaucomatoso betabloqueador

Uso adulto

Composição por ml

Cloridrato de levobunolol 5 mg

Veículo estérilq.s.p. 1 ml

Conservante: cloreto de benzalcônio 0,005%

Informação técnica

O levobunolol é um bloqueador beta-adrenérgico não-seletivo, que age com igual potência sobre os receptores adrenérgicos beta-1 e beta-2. Seu mecanismo de ação não é conhecido, podendo atuar, provavelmente, como o timolol, reduzindo a produção de humor aquoso.

É possível manter uma significativa diminuição da pressão ocular durante as 24 horas seguintes à administração de uma dose única.

Indicações

Controle da pressão intra-ocular em glaucoma crônico de ângulo aberto e hipertensão ocular.

Contra-indicações

B-Tablock (levobunolol) é contra-indicado em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica grave, broncoespasmo, incluindo asma brônquica ou com história de asma brônquica, insuficiência cardíaca congestiva não controlada, bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus, bradicardia sinusal, choque cardiogênico e nos pacientes hipersensíveis a quaisquer dos componentes do produto.

Reações adversas

Queimação ocular passageira, ardor e blefaroconjuntivites. Foram ocasionalmente relatados casos de diminuição de batimento cardíaco e da pressão sanguínea.

Posologia

A dose usual é uma gota de **B-Tablock** (levobunolol) 0,5% no(s) olho(s), duas vezes ao dia, a critério médico.

Apresentação

Solução oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 5 e 10 ml

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

B-Tablock (levobunolol): Reg. M.S. 1.1725.0020.001-6 = apresentação de 5 ml e Reg. M.S. 1.1725.0020.002-4 = apresentação de 10 ml

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322