

Tenliv

Tanacetum parthenium

MEDICAMENTO
FITOTERÁPICO



IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nomenclatura botânica: Tanacetum parthenium L. Sch. Bip.

Família: Asteraceae

Nome Popular: Tanaceto

Parte da planta utilizada: Folhas

“Medicamento fitoterápico registrado com base no uso tradicional”

“Não é recomendado o uso por período prolongado enquanto estudos clínicos amplos sobre segurança não forem realizados”

APRESENTAÇÕES

Comprimido Revestido de 120mg – caixa com 04, 08 e 30 comprimidos revestidos.

Cada comprimido revestido contém:

Extrato seco de Tanacetum parthenium.....100mg

(equivalente à 0,6 mg de partenolídeo)

USO ADULTO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Tenliv - cada comprimido revestido contém:

Extrato seco de Tanacetum

parthenium.....100mg

(equivalente à 0,6 mg de partenolídeo)

Excipientes: celulose + lactose, dióxido de silício, lactose, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, talco, polietilenoglicol 6000, dióxido de titânio, copolímero básico metacrílico E 100, álcool isopropílico, corante lacca alumínio amarelo nº 6, polivinilpirrolidona e água de osmose.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) está indicado na profilaxia da enxaqueca.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) é um medicamento fitoterápico à base da planta Tanacetum parthenium L. Sch. Bip., pertencente à família das Asteraceae/Compositae. Suas partes aéreas, mais precisamente as folhas, possuem um componente chamado partenolídeo, responsável pelas suas propriedades terapêuticas, como a profilaxia (prevenção) da enxaqueca.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) está contra-indicado se você tem hipersensibilidade à planta ou a outros membros da família das Asteraceae/ Compositae como a Camomila e a Erva-de-Santiago e a qualquer constituinte da formulação. Não deve ser ingerido por indivíduos que tenham alergia de contato à planta (Tanacetum parthenium).

O uso de Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) é contra-indicado durante a gravidez e lactação por haver risco de aborto devido às contrações uterinas. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se estiver amamentando.

Crianças: seu uso não é recomendado em crianças menores de 12 anos.

Este medicamento deve ser interrompido pelo menos 2 semanas antes de algum procedimento cirúrgico, pois ele pode aumentar o risco de sangramento.

“Este medicamento é contra-indicado para uso por mulheres grávidas ou amamentando”

“Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos”

“Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista”

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos da ocorrência de danos à saúde ou efeitos colaterais com o uso de **Tenliv** (Extrato seco de Tanacetum parthenium) em dosagem terapêutica recomendada. Foi relatada a ocorrência ocasional de dermatites de contato, irritação e ulceração de mucosa oral, diarreia, flatulência, náuseas, vômitos, dor abdominal e desconforto gástrico no uso prolongado de **Tenliv** (Extrato seco de Tanacetum parthenium). O potencial para sensibilização via contato cutâneo com a droga é alto, embora a dermatite de contato seja vista apenas ocasionalmente.

A suspensão da medicação preventiva deve ser feita de maneira gradativa e começar após quatro a seis meses de sucesso (diminuição da frequência, intensidade e duração das crises).

Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) está contra-indicado durante a gravidez e lactação por haver risco de aborto devido à indução de contrações uterinas.

Crianças: não há estudos sobre o uso de Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) em crianças, logo, o seu uso neste grupo deve ser criteriosamente avaliado pelo médico. De uma forma geral deve-se evitar seu uso em crianças menores de 12 anos.

Uso em idosos e outros grupos de risco: para pacientes com idade superior a 65 anos até o momento não há relatos de efeitos prejudiciais.

Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) está contra-indicado para pacientes que fazem uso concomitante de medicamentos antitrombóticos (para “afinar” o sangue) como o ácido acetilsalicílico, clopidogrel, enoxparina, heparina, dalteparina e a varfarina. O mecanismo dessa interação se deve a ação tanto do Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) como dessas drogas sobre a coagulação.

Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) pode alterar o tempo de ação e a atividade de algumas drogas que como ele, são metabolizadas pelo fígado. Alguns exemplos abaixo:

Amitriptilina, haloperidol, ondasentron, propranolol, teofilina, verapamil, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, diazepam, carisoprodol, nefinavir, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, celecoxibe, amitriptilina, warfarin, glipizida, losartan, lovastatina, cetoconazol, itraconazol, fexofenadina e triazolam.

Exames laboratoriais: não foram encontrados relatos sobre alterações decorrentes do uso de **Tenliv** (Extrato seco de Tanacetum parthenium).

“Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista”

“Informe seu medico ou cirurgião-dentista se você esta fazendo uso de algum outro medicament.”

“Não use medicamento sem conhecimento de seu medico. Pode ser perigoso a sua saúde”

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o medicamento em sua embalagem original, protegendo da luz, calor e umidade, em temperatura ambiente entre 15 e 30°C. Nesta condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade iniciado na embalagem.

Tenliv (Extrato seco de Tanacetum parthenium) comprimido revestido, arredondados, de cor salmão e odor de ervas.

“Número de lote, datas de fabricação e data de validade: vide embalagem”

“Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original”

“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento”

“Todo o medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças”

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Comprimido revestido 120mg: deve ser utilizado por via oral na dose de 1 comprimido ao dia.

Os comprimidos revestidos devem ser ingeridos inteiros e sem mastigar com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidas.

Assim como todos os medicamentos informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre medicamentos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administrada ao mesmo tempo.

“Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico”

“Este medicamento não pode ser partido, aberto ou mastigado”

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se, por acaso esquecer-se de tomar uma dose, tome-a o mais breve possível.

Se já estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e retorne ao esquema regular de doses.

Não tome uma dose dupla ou doses extras.

“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião- dentista”

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Foi relatado a ocorrência ocasional de dermatites de contato, irritação e ulceração de mucosa oral, diarreia, flatulência, náuseas, vômitos, dor abdominal e desconforto gástrico no uso prolongado. Não existem relatos de efeitos colaterais com o uso apropriado da substância em dosagem terapêutica.

“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento”

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em casos de superdosagem aconselha-se o esvaziamento gástrico e suporte cardiorrespiratório. Estudos clínicos demonstraram a não ocorrência de efeitos colaterais com a ingestão de dosagens de 100 a 150 vezes maior que a dose diária recomendada para humanos.

“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações”

DIZERES LEGAIS

Registro M.S: 1.1861.0100

Responsável Técnico: Dra. Amanda Públio da Silva – CRF: 37.152

Fabricado por:

Ativus Farmacêutica Ltda.

Rua: Fonte Mécia nº 2050 – CEP: 13270-000 – Caixa Postal 489 – Valinhos-SP

CNPJ: 64.088.172/0001-41

Industria Brasileira

SAC: 0800 771 20 10

cód. 13.309 rev 8.11 (A)

