

Apresentação de Dimetapp

compr. cx. c/ 28 un. Drg. AP cx. c/ 12 un. Elixir fr. c/ 120 ml

Dimetapp - Indicações

alívio temporário da congestão nasal nas manifestações alérgicas do sistema respiratório superior, tais como: resfriado comum, alergias sazonais, sinusite e rinite .

Contra-indicações de Dimetapp

pessoas hipersensíveis aos componentes da fórmula, hipertensão grave e problema arteriocoronariano e em pessoas em terapia com inibidores da monoaminoxidase (IMAO). **Dimetapp** não deve ser usado no primeiro trimestre de gravidez.

Advertências

Interferência em exames laboratoriais: os anti-histamínicos podem inibir a resposta aos testes cutâneos com extratos de alérgenos, ocasionando, em alguns pacientes, resultados falso-negativos.

Uso na gravidez de Dimetapp

como com todo medicamento, mulheres grávidas ou em fase de amamentação devem procurar orientação médica antes de usar este produto. **Dimetapp** não deve ser usado no primeiro trimestre de gravidez.

Interações medicamentosas de Dimetapp

Com inibidores da monoaminoxidase (IMAO) pode produzir crise hipertensiva. Certos agentes anti-hipertensivos podem ter seus efeitos diminuídos.

Reações adversas / Efeitos colaterais de Dimetapp

apesar de raros, e geralmente em casos de superdosagem, podem ocorrer: discrasias sangüíneas, taquicardia ou taquiarritmia, episódios psicóticos (geralmente associados com história prévia de problemas psiquiátricos). **Dimetapp** pode causar sonolência, dependendo da suscetibilidade individual de cada paciente. Podem ocorrer tontura, náuseas , vômitos, dor de cabeça, ansiedade, insônia, dificuldade ou dor ao urinar, perda de apetite e secura da boca. Advertências: pacientes com as seguintes condições são advertidos para que não usem este produto, exceto sob orientação médica: asma , problemas pulmonares crônicos, enfisema , dificuldade respiratória, hipertensão, problemas cardíacos, diabetes , distúrbios da tireóide, glaucoma ou dificuldade em urinar devido ao aumento da glândula prostática. Este produto pode causar sonolência; álcool, sedativos e tranqüilizantes podem aumentar este efeito, motivo pelo qual os pacientes devem ser orientados para não fazer uso dos mesmos enquanto estiverem tomando este produto, exceto sob orientação médica. Deve-se ter cuidado ao dirigir veículos motorizados ou operar máquinas. Pode causar excitabilidade, especialmente em crianças. Os pacientes devem ser advertidos para não exceder as dosagens recomendadas, porque altas doses podem provocar nervosismo, tontura ou insônia. Devem também ser advertidos para não tomar este produto por mais de 7 dias. Caso os sintomas não desapareçam ou estejam acompanhados de febre , deve-se retornar ao médico.

Dimetapp - Posologia

Dimetapp Comprimidos : adultos e crianças acima de 12 anos: 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia. Não exceder 6 doses em 24 horas. **Dimetapp** AP drágeas Ação Prolongada: adultos e crianças acima de 12 anos: 1 drágea a cada 12 horas. Não exceder 1 drágea em 12 horas ou 2 drágeas em 24 horas. **Dimetapp**Elixir: adultos e crianças acima de 12 anos: 1/2 a 1 copo medida (5 a 10 ml), 3 a 4 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 1/2 copo medida (5 ml), 3 a 4 vezes ao dia. Não exceder 6 doses em 24 horas.

Superdosagem

Indução do vômito . Lavagem gástrica com solução de cloreto de sódio 0,45% no caso de pacientes com dificuldades de vomitar. Tratamento de suporte (terapia de suporte) etc.

Dimetapp - Informações

Não é indicado para pacientes menores de 2 anos. Composição **Dimetapp** Comprimidos: cada comprimido contém: maleato de bromofeniramina 4 mg, cloridrato de fenilefrina 5 mg, cloridrato de fenilpropanolamina 5 mg. **Dimetapp** AP Drágeas Ação Prolongada: cada drágea contém: maleato de bromofeniramina 12 mg, cloridrato de fenilefrina 15 mg, cloridrato de fenilpropanolamina 15 mg. **Dimetapp**Elixir: cada 5ml contém: maleato de bromofeniramina 4 mg, cloridrato de fenilefrina 5 mg, cloridrato de fenilpropanolamina 5 mg.