

Composição - FIBRASE

CADA G CONTEM: FIBRINOLISINA 1 U(LOOMIS); DESOXIRRIBONUCLEASE 666 UND; CLORANFENICOL 10 MG.

Posologia e Administração - FIBRASE

CONSIDERANDO-SE QUE VARIAM MUITO DE INTENSIDADE OS CASOS NOS QUAIS SE INDICA O EMPREGO DE **FIBRASE** COM CLORANFENICOL, DEVERA O MEDICO AJUSTAR DEVIDAMENTE AS APLICACOES PARA CADA CASO; AS SEGUINTE RECOMENDACOES GERAIS PODEM SER FEITAS: O SUCESSO DO USO DE DEBRIDAMENTO ENZIMATICO DEPENDE DE VARIOS FATORES: ESCARA SECA E COMPACTA, SE PRESENTE, DEVE SER REMOVIDA CIRURGICAMENTE ANTES DO DEBRIDAMENTO ENZIMATICO SER REALIZADO; A ENZIMA NECESSITA ESTAR EM CONTATO CONSTANTE COM O SUBSTRATO; DEBRIS NECROTICOS ACUMULADOS NECESSITAM SER REMOVIDOS PERIODICAMENTE; A ENZIMA NECESSITA SER PROVIDA, NO MINIMO, UMA VEZ AO DIA; CICATRIZACAO SECUNDARIA OU ENXERTO DE PELE NECESSITA SER EMPREGADO TAO LOGO SEJA POSSIVEL APOS TER OBTIDO DEBRIDAMENTO OTIMO. E PRIMORDIAL QUE A TECNICA DE CURATIVO SEJA REALIZADA EM CONDICOES ASSEPTICAS E QUE SEJAM ADMINISTRADOS CONCOMITANTEMENTE ANTIBIOTICOS DE ACAO SISTEMICA ADEQUADA E SE, NA OPINIAO DO MEDICO, FOREM INDICADOS. USO TOPICO: A APLICACAO LOCAL DEVE SER REPETIDA A INTERVALOS REGULARES DURANTE O TEMPO QUE SE DESEJE A ACAO ENZIMATICA DO PRODUTO. APOS A APLICACAO, **FIBRASE** COM CLORANFENICOL TORNA-SE MENOS ATIVO, RAPIDA E PROGRESSIVAMENTE, E SE EXTINGUE, PROVAVELMENTE, NO FIM DE 24 HORAS. USO VAGINAL: EM CERVICITE E VAGINITE MODERADAS, INTRODUIR 5 G DE **FIBRASE** COM CLORANFENICOL NA VAGINA TODAS AS NOITES AO DEITAR POR APROXIMADAMENTE CINCO APLICACOES OU ATE QUE TODO O CONTEUDO DE UMA BISNAGA DE 30 G TENHA SIDO USADO. A PACIENTE DEVE CONSULTAR O SEU MEDICO PARA DETERMINAR SE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E NECESSARIO.

Precauções - FIBRASE

O USO PROLONGADO DE ANTIBIOTICOS PODE RESULTAR OCASIONALMENTE EM CRESCIMENTO DE ORGANISMOS NAO SUSCETIVEIS AO TRATAMENTO, INCLUINDO FUNGOS. SE APARECEREM NOVAS INFECCOES DURANTE O TRATAMENTO, O MEDICAMENTO DEVERA SER DESCONTINUADO E OUTRAS MEDIDAS ADEQUADAS DEVEM SER TOMADAS. COM EXCECAO DOS CASOS DE INFECCOES SUPERFICIAIS, O USO DE CLORANFENICOL DEVE SER SUPLEMENTADO POR MEDICACAO SISTEMICA APROPRIADA. AS PRECAUCOES USUAIS CONTRA REACOES ALERGICAS DEVEM SER OBSERVADAS, PARTICULARMENTE NAS PESSOAS COM HISTORIA DE SENSIBILIDADE AOS PRODUTOS DE ORIGEM BOVINA OU COMPOSTOS MERCURIAIS. - INTERACOES MEDICAMENTOSAS: NAO EXISTE UMA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE CONFIRME A OCORRENCIA DE INTERACOES CLINICAMENTE RELEVANTES.

Reações Adversas - FIBRASE

COM O EMPREGO DE DOSES E INDICACOES RECOMENDADAS, NAO TEM SIDO RELATADOS EFEITOS INDESEJAVEIS ATRIBUIVEIS AS ENZIMAS. EM ALTAS CONCENTRACOES AS REACOES ADVERSAS TEM SIDO MINIMAS CONSISTINDO EM HIPEREMIA LOCAL. TREMORES E FEBRE ATRIBUIVEIS A ACAO ANTIGENICA DE ATIVADORES PROFIBRINOLISINA DE ORIGEM BACTERIANA NAO SAO PROBLEMAS COM **FIBRASE**. PACIENTES SENSIVEIS AO CLORANFENICOL PODEM APRESENTAR SINAIS DE IRRITACAO LOCAL, COM SINTOMAS SUBJETIVOS DE PRURIDO OU ARDENCIA, EDEMA ANGIONEUROTICO, URTICARIA, DERMATITE VESICULAR E MACULOPAPULAR. NESTES CASOS A MEDICACAO DEVE SER DESCONTINUADA. PODEM OCORRER REACOES DE SENSIBILIDADE IDENTICA A OUTROS MATERIAIS NAS PREPARACOES TOPICAS.

AS DISCRASIAS SANGUINEAS TEM SIDO ASSOCIADAS AO USO DE CLORANFENICOL.

Contra-indicações - FIBRASE

HIPER-SENSIBILIDADE PREVIA A ALGUM DE SEUS COMPONENTES. - ADVERTENCIA: TEM SIDO RELATADOS CASOS DE HIPOPLASIA DA MEDULA OSSEA, INCLUINDO ANEMIA APLASTICA E MORTE, APOS A APLICACAO LOCAL DE CLORANFENICOL.

Indicações - FIBRASE

INDICADO NO TRATAMENTO DE LESOES INFECTADAS, TAIS COMO, QUEIMADURAS, ULCERAS E FERIDAS ONDE A DUPLA ACAO COMO AGENTE DEBRIDANTE E ANTIBIOTICO TOPICO E REQUERIDA. ESTA ACAO DUPLA E ESPECIALMENTE BENEFICA NO TRATAMENTO DE INFECCOES CAUSADAS POR ORGANISMOS QUE UTILIZAM UM PROCESSO DE DEPOSICAO DE FIBRINA COMO MEIO DE PROTECAO (POR EX. COAGULASE E ESTAFILOCOCOS). DEVEM SER TOMADAS MEDIDAS APROPRIADAS PARA DETERMINAR A SUSCETIBILIDADE DO PATOGENO AO CLORANFENICOL.

Apresentação - FIBRASE

UNGUENTO: EM BISNAGA DE 10 G E 30 G; UNGUENTO EM BISNAGA DE 30 G ACOMPANHADO DE UM APLICADOR GINECOLOGICO.