

Indicações: USO ADULTO/ USO PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS / USO ORAL. DELTAFLAN (nimesulida) combate inflamações, dores e febre. Contraindicações: DELTAFLAN (nimesulida) NÃO DEVE SER UTILIZADO POR: - Pacientes que tenham alergia à nimesulida ou a qualquer outro componente do medicamento, ao ácido acetilsalicílico ou a outros anti-inflamatórios (informe seu médico caso você tenha alergia a algum produto); - Pacientes com úlcera péptica (no estômago ou duodeno) em fase ativa, ulcerações recorrentes ou com hemorragia no trato gastrointestinal; - Pacientes com distúrbios de coagulação grave - Pacientes com insuficiência cardíaca grave;- Pacientes com mau funcionamento dos rins grave;- Pacientes com mau funcionamento do fígado; - Mulheres grávidas ou em fase de amamentação; - Crianças menores de 12 anos. Posologia: Você deve usar DELTAFLAN (nimesulida) apenas sob a orientação do médico. “USO PARA ADULTOS E CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS” Você pode tomar DELTAFLAN (nimesulida) comprimidos, comprimidos dispersíveis, gotas ou suspensão oral após as refeições. Recomenda-se usar DELTAFLAN (nimesulida), como todos os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), com a menor dose segura e com o menor tempo possível de duração do tratamento. Comprimidos: 100mg, tomar 1/2 a 1 comprimido com 1/2 copo de água duas vezes ao dia, podendo alcançar até 200 mg duas vezes ao dia. Comprimidos dispersíveis: 100mg (1 comprimido), tomar duas vezes ao dia, podendo alcançar até 200mg duas vezes ao dia. Dissolver o comprimido em 1/2 copo de água (100 mL), agitar com auxílio de uma colher e tomar. Se necessário, você pode colocar mais um pouco de água no copo, mexer com a colher e tomar em seguida. Se preferir o comprimido dispersível você pode tomá-lo inteiro, sem a necessidade de dissolver antes. Gotas: cada gota contém 2,5mg de nimesulida e cada mL de DELTAFLAN (nimesulida) contém 50 mg de nimesulida, pingar 1 gota (2,5mg) por kg de peso, duas vezes ao dia, diretamente na boca da criança (acima de 12 anos) ou se preferir dilua em um pouco de água com um pouco de açúcar. CADA ML DO PRODUTO CONTÉM 20 GOTAS. Suspensão: a dose recomendada é de 5mg/kg/dia - fracionada a critério médico em duas administrações. Agitar antes de usar. Colocar a dose recomendada pelo médico no copo-medida que acompanha o produto e pedir para a criança tomar. Lembramos que 1 mL da suspensão contém 10mg de nimesulida

Advertências: Se você teve ou tem formação de úlcera péptica, inflamações nos intestinos ou mau funcionamento do fígado, você deve usar o medicamento com atenção. Pacientes idosos são mais sensíveis às reações desagradáveis dos antiinflamatórios não esteroidais (AINEs). Não se recomenda, em idosos, o uso prolongado de AINEs. Se o tratamento prolongado com nimesulida for necessário, deve haver a monitoração dos pacientes. Se os AINEs interferirem na função plaquetária, os pacientes com problema de coagulação, como por exemplo hemofilia e pré-disposição a sangramento devem usar esse medicamento com cuidado. Com relação ao uso de nimesulida em crianças, ocorreram algumas reações severas, incluindo casos muito raros compatíveis com Síndrome de Reye. Reações Adversas: Deltaflan (nimesulida) pode causar reações desagradáveis, tais como: dor de cabeça, sonolência, tontura, urticária, coceira, icterícia, perda de apetite, dor de estômago, enjoo, vômito, diarreia, diminuição do volume urinário, urina escura, diminuição da temperatura do corpo, asma entre outras. Podem ocorrer reações alérgicas. Ocorreram casos isolados de síndrome de Stevens- Johnson e de hepatite aguda fulminante.

Interações Medicamentosas: Não se aconselha usar medicamentos que provoquem irritação no estômago durante o tratamento com DELTAFLAN (nimesulida). Medicamentos que podem interagir com DELTAFLAN (nimesulida): fenofibrato, ácido salicílico, ácido valpróico, tolbutamida, ácido acetilsalicílico, metotrexato, varfarina, fenitoína, lítio e probenecida. Se você estiver com dúvida, consulte seu médico. Você pode tomar DELTAFLAN (nimesulida) após as refeições. Durante o tratamento com DELTAFLAN (nimesulida), não se aconselha a ingestão de alimentos que provoquem irritação no estômago (tais como abacaxi, laranja, limão, café e etc.). Você não deve tomar bebidas alcoólicas durante o tratamento.