

Artoglico

sulfato de glicosamina

FORMAS FARMACÊUTICAS, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES

Pó para solução oral. Embalagens com 1, 7 ou 30 sachês de dose única.

Uso Oral

Uso Adulto

COMPOSIÇÃO

Cada sachê contém:

sulfato de glicosamina **1,5 g

excipientes *q.s.p.....3,95 g

* sorbitol, ácido cítrico, macrogol e aspartamo.

**equivalente a 1,884g de sulfato de glicosamina sódica.

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: Artoglico® é um medicamento utilizado no tratamento de artrose primária e secundária, osteocondrose, espondilose, condromalácia de rótula, periartrite escápulo-umeral.

Cuidados de armazenamento: Conservar o produto em sua embalagem original. Manter à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

Prazo de validade: O número de lote e as datas de fabricação e validade estão impressos no cartucho do medicamento. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Gravidez e lactação: Não há dados com relação ao uso de sulfato de glicosamina na gravidez e lactação humana, portanto, seu uso não é recomendado nestes casos. Este medicamento só deve ser administrado sob supervisão médica.

Cuidados de administração: Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: Informe o seu médico caso ocorram reações desagradáveis. Os efeitos adversos mais comuns são reações de origem gastrointestinal de intensidade leve a moderada, como desconforto gástrico, diarreia, náusea, prurido e cefaléia.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Interações Medicamentosas: A administração oral de sulfato de glicosamina pode favorecer a absorção gastrointestinal de tetraciclinas e reduzir a de penicilina e cloranfenicol. Não existe limitação para administração simultânea de analgésicos ou antiinflamatórios esteróides e não esteróides.

Contra-indicações/Precauções: **Artoglico®** é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade a glicosamina ou a qualquer outro componente da fórmula. Também não deve ser utilizado durante a gravidez, lactação ou em casos de fenilcetonúria. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PREJUDICIAL A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Mecanismo de ação

O sulfato de glicosamina é uma molécula naturalmente presente no organismo humano utilizada para a biossíntese dos proteoglicanos, substância fundamental da cartilagem articular e do ácido hialurônico do líquido sinovial. Esta biossíntese é alterada na artrose, processo degenerativo dismetabólico que compromete a cartilagem articular. Normalmente a chegada da glicosamina na articulação está assegurada por processo de biotransformação da glicose. Na artrose tem sido observada ausência local de glicosamina devido a uma diminuição da permeabilidade da cápsula articular e por alterações enzimáticas nas células da membrana sinovial e da cartilagem. Nestas situações propõe-se entrada exógena de sulfato de glicosamina como suplemento das carências endógenas desta substância, estimulação da biossíntese dos proteoglicanos, desenvolvimento de uma ação trófica nos sulcos articulares e favorecimento da fixação de enxofre na síntese do ácido condroitinsulfúrico e a disposição normal de cálcio no tecido ósseo. A experiência clínica também confirma a ótima tolerância de glicosamina devido a sua origem natural.

INDICAÇÕES

É indicado no tratamento de artrose primária e secundária, osteocondrose, espondilose, condromalácia de rótula, periartrite escápulo-umeral.

CONTRA-INDICAÇÕES

Artoglico® é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade a glicosamina ou a qualquer outro componente da fórmula. Também não deve ser utilizado durante a gravidez, lactação ou em casos de fenilcetonúria.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Informar ao médico caso esteja utilizando outros medicamentos.

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A administração oral de sulfato de glicosamina pode favorecer a absorção gastrointestinal de tetraciclinas e reduzir a de penicilina e cloranfenicol.

REAÇÕES ADVERSAS

Os efeitos colaterais mais comuns são de origem gastrointestinal, de intensidade leve a moderada, consistindo em desconforto gástrico, diarreia, náusea, prurido e cefaléia.

Reações hematológicas: não foram observadas alterações clínicas significativas durante os estudos.

Testes laboratoriais: não se observam diferenças significativas nos valores médios nem nos dados individuais das provas laboratoriais e constantes vitais.

POSOLOGIA

1 sachê por dia, dissolvido em um copo com água.
Duração do tratamento: a critério médico.

CONDUTA NA SUPERDOSAGEM

Não é conhecido antídoto específico para glicosamina. Em caso de superdosagem recomendam-se as medidas de suporte clínico.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. MS nº 1.3569.0280

Farm. Resp.: Dr. Adriano Pinheiro Coelho. CRF-SP nº 22.883

Fabricado por: **EMS S/A**

Rod. Jornalista F. A. Proença, km 08

Bairro Chácara Assay - CEP: 13186-901 - Hortolândia/SP

“Lote, Fabricação e Validade: vide cartucho”