

**Antistax**<sup>®</sup>  
*Vitis vinifera*  
videira  
vitaceae  
folhas

## APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos de 360 mg: embalagens com 12, 18 e 30 comprimidos.

## USO ORAL

### USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém 360 mg de extrato seco de folhas de *Vitis vinifera*.

(Contém 3% a 7% de flavonoides totais: como quercetina-3-O-beta-D-glucuronida)

Excipientes: hipromelose, triestearina, dióxido de titânio, talco, óxido férrico vermelho, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, crospovidona, fosfato de cálcio dibásico, dióxido de silício, estearato de magnésio.

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ANTISTAX é indicado para o tratamento de dores nas pernas, dores varicosas, sintomas de varizes (tais como inchaço, peso nas pernas, cansaço, sensação de tensão e formigamento), dores nas pernas relacionadas a varizes e dores após o tratamento de varizes realizado com aplicação de medicamento na veia doente.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O extrato de folhas de *Vitis vinifera* representa uma mistura complexa de classes diferentes de compostos que demonstraram atividade anti-inflamatória, que protegem a parede das veias normalizando sua permeabilidade. A redução no extravasamento de plasma (saída de líquido das veias), proteínas ou água para os tecidos em volta dos vasos inibe a formação de inchaço e reduz os inchaços já existentes.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar ANTISTAX se tiver alergia ao extrato de folhas de *Vitis vinifera* ou a qualquer componente da fórmula.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você tiver, principalmente em uma das pernas, inchaço repentino, vermelhidão na pele, sensação de tensão, calor e dor, deverá consultar um médico. Estes sintomas podem ser devido a tromboflebite (inflamação da veia devido a um coágulo), e não estão associados ao tratamento com extrato de *Vitis vinifera*, sendo assim o tratamento com ANTISTAX pode ser mantido.

Caso você não obtenha os resultados esperados após um período 6 semanas de tratamento, você deverá consultar um médico, pois o inchaço pode ser devido a outras causas.

### Gravidez e Amamentação

O uso de ANTISTAX não é recomendado durante a gravidez e amamentação.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### Interações Medicamentosas

Até o momento não são conhecidas interações de ANTISTAX com outros medicamentos.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

## **ANTISTAX PACIENTE**

Os comprimidos de ANTISTAX são vermelho-amarronzados, de formato alongado, sem sulco de quebra, com odor aromático.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve ingerir os comprimidos de ANTISTAX inteiros, com água, antes das refeições.

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

A dose recomendada de ANTISTAX é de 1 comprimido revestido (360 mg) pela manhã, podendo ser aumentada para 2 comprimidos revestidos (720 mg) ao dia, pela manhã.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Continue tomando as próximas doses regularmente no horário habitual. Não duplique a dose na próxima tomada.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

- Reações incomuns (ocorrem entre 0,1 % e 1 % dos pacientes que utilizam este medicamento): enjoo, desconforto abdominal e outros sintomas do sistema digestivo; vermelhidão, descamação e coceira na pele.
- Reações com frequência desconhecida: alergia e placas elevadas na pele, geralmente com coceira.

**Atenção: este produto é um medicamento que possui nova concentração no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Até o momento não foram relatados casos de superdose ou intoxicação com ANTISTAX.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**ANTISTAX PACIENTE**

MS 1.0367.0163

Farm. Resp.: Dímitra Apostolopoulou – CRF-SP 08828

**Importado por:**

Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. Ltda.

Rod. Régis Bittencourt, km 286

Itapecerica da Serra – SP

CNPJ 60.831.658/0021-10

SAC 0800 701 6633

**Fabricado por:**

Delpharm Reims

Reims, França

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

CCDS 0200-05 20101027

C10-02