medicamentos, deve-se imediatamente procurar orientação médica, apresentando ao médico todos os medicamentos utilizados pelo paciente, inclusive o ingerido em maior quantidade.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Fabricado por
BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda.
Rua Solange Aparecida Montan, 49
Jandira - SP - CEP 06610-015

Registrado por
BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda.
Av. Paulo Ayres, 280 - Taboão da Serra - SP
CEP 06767-220 - SAC 0800 724 6522
CNPJ 49.475.833/0001-06
Indústria Brasileira

Registro MS - 1.0974.0220
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior - CRF-SP nº 5143

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 12/09/2011.

022637A1 - Laetus: 3077 - Dim.: 320X180 mm

GOB 6®
cloridrato de piridoxina

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

• **APRESENTAÇÃO**:
Comprimidos mastigáveis de 25 mg em embalagem com 18 comprimidos mastigáveis.

• **USO ORAL.**

• **USO ADULTO.**

• **Composição:**
Comprimido
GOB 6® 25 mg:
Cada comprimido mastigável contém:
cloridrato de piridoxina ..... 25 mg
Excipientes:
Extrato seco de gengibre 3% ..... 33,33 mg
Aroma de chocolate, aroma de canela, aroma de maçã, pó de cacau, dióxido de silício coloidal, sucralose, povidona, manitol, xilitol, polietilenoglicol 8000, estearato de magnésio, talco e álcool etílico.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
GOB 6® é indicado para náuseas e vômitos no pri-

meiro trimestre da gravidez.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
GOB 6® contém cloridrato de piridoxina (vitamina B6), que se torna ativo através da metabolização pelo fígado, atua no metabolismo de proteínas e aminas presentes no organismo, como as aminas cerebrais (serotonina, norepinefrina e dopamina).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
GOB 6® é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, nos casos de úlcera péptica, pielonefrite, esteatose hepática na gravidez, bem como diabetes mellitus descompensado por cetoacidose e tirotoxicose.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
A principal precaução é: uso concomitante com levodopa (pode haver diminuição da eficácia da levodopa). Pela dose que apresenta, a forma comprimidos não deve ser administrada às crianças menores de 12 anos.

GOB 6® (cloridrato de piridoxina) pode apresentar interação com outros medicamentos, dentre eles: isoniazida, ciclosserina, hidralazina.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO QUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Mantenha **GOB 6®** em temperatura ambiente (15 a 30ºC), protegido da luz e da umidade.
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagens.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

GOB 6® apresenta-se na forma de comprimidos circulares biconvexos, de cor marrom com pontos brancos e com predomínio do sabor de gengibre.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
GOB 6® deve ser administrado somente por via oral.
Recomenda-se a dosagem de 1 comprimido com 25 mg de cloridrato de piridoxina a cada 8 horas durante 3 dias.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso esqueça-se de usar o medicamento, reiniciar o tratamento, respeitando os intervalos entre as doses.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
As principais reações adversas relatadas estão diretamente ligadas a altas doses e uso prolongado.
Reação rara (> 0,01% e < 0,1%): trombocitopenia (diminuição da quantidade de plaquetas no sangue); insônia; disfunção de memória; sedação; fotossensibilidade (sensibilidade a luz solar).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
A qualquer ingestão de grande quantidade de