

FLORINY

Passiflora incarnata + *Crataegus oxyacantha* + *Salix alba*

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Nomenclatura Botânica Oficial: *Passiflora incarnata* L.

Família: *Passifloraceae*

Parte da planta utilizada: Flores e Folhas

Nome Popular: Maracujá Silvestre

Nomenclatura Botânica Oficial: *Crataegus oxyacantha* L.

Família: *Rosaceae*

Parte da planta utilizada: Flores e Folhas

Nome Popular: Espinheiro Alvar

Nomenclatura Botânica Oficial: *Salix alba* L.

Família: *Salicaceae*

Parte da planta utilizada: Casca

Nome Popular: Salgueiro Branco

APRESENTAÇÕES

Líquido (Solução Oral): frasco com 30, 50 e 100 ml. Acompanha copo medida.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada ml contém:

Extrato fluido de *Passiflora incarnata* L. à 0,04% de flavonóides como vitexina e isovitexina..... 0,05 ml

(equivalente à 0,02 mg de vitexina e isovitexina)

Alcoolato de *Crataegus oxyacantha* L. à 0,04% de flavonóides como hiperosídeo..... 0,038 ml

(equivalente à 0,0152 mg de hiperosídeo)

Extrato mole de *Salix alba* L. à 0,3% de salicina 50,00 mg

(equivalente à 0,15 mg de salicina)

Excipientes: açúcar, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, ácido cítrico, água de osmose, corante

caramelo.

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para ansiedade, enurese de origem não orgânica (perda involuntária de urina), hipertensões (pressão alta) leves, insônia (dificuldade em dormir), irritabilidade.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento funciona como um calmante leve ajudando também a ter uma boa noite de sono.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes que apresentam alergia a qualquer componente da fórmula, ao látex, ácido acetilsalicílico, mulheres grávidas e que estejam amamentando não devem utilizar este medicamento.

Pacientes com problemas de coagulação, hemorragias, úlceras gastrintestinais devem evitar o uso deste medicamento.

Este medicamento é contraindicado na pediatria.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Devido a sua ação sedativa, deve-se ter cautela na administração deste medicamento juntamente com ansiolíticos e antidepressivos. Durante o tratamento com *Passiflora incarnata* o paciente não deve dirigir ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Nos casos de pacientes com funções prejudicadas dos rins ou fígado, não se recomenda a utilização desse medicamento, salvo se houver recomendação médica em contrário.

Deve-se ter cuidado na administração deste medicamento juntamente com anti-inflamatórios. O extrato de *Crataegus oxyacantha* aumenta o efeito dos glicosídeos cardiotônicos, betabloqueadores e outras drogas hipotensivas. A ingestão de bebidas alcoólicas não é recomendada durante a utilização de extratos de *Passiflora incarnata*. O extrato de *Salix alba* pode aumentar o efeito de anticoagulantes.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o medicamento em sua embalagem original, protegendo da luz, calor e umidade, em temperatura ambiente entre 15 e 30° C. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

A solução oral é um líquido de coloração pardo escuro com odor característico e sabor doce.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 3 copos-medida (15mL) a 4 copos-medida (20 mL), 1 ou 2 vezes ao dia.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Este medicamento é bem tolerado.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): sonolência, dor de cabeça, dor de estômago, fadiga, diarreia, náusea, zumbido, coceira, vermelhidão na pele.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Os sintomas que caracterizam a superdosagem deste medicamento são: dificuldade em respirar, sonolência excessiva, irritação gástrica e renal, sangramento nas fezes, zumbido nos ouvidos, náuseas e vômito. Nestes casos, suspenda o uso e procure orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

M.S. nº 1.1861.0107

Farm. Resp.: Dra. Amanda Públio da Silva- CRF-SP nº 37.152

ATIVUS FARMACÊUTICA LTDA.

Rua: Fonte Mécia nº 2.050 - CEP 13270-000

Caixa Postal 489 - Valinhos/ SP

CNPJ nº 64.088.172/0001-41

Indústria Brasileira

SAC 0800 551767

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

