

Sanilin[®]
cloreto de cetilpiridínio
benzocaína

HERTZ[®]

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Pastilha: tubo plástico com 12 pastilhas. Sabores cereja, laranja e menta.

Solução oral: frasco de vidro spray com 30 ml. Sabor menta.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

SANILIN PASTILHAS

Cada pastilha contém:

cloreto de cetilpiridínio 1,466 mg
benzocaína 10,000 mg
Excipiente q.s.p. 1 pastilha
(Excipientes: amido, carbonato de cálcio, estearato de magnésio, aroma, corante, lactose, mentol, sacarina sódica, sacarose, silicato de magnésio, povidona e água deionizada).

SANILIN SPRAY

Cada ml contém:

cloreto de cetilpiridínio 0,500 mg
benzocaína 4,000 mg
Veículo q.s.p. 1 ml
(Veículo: edetato dissódico, cloreto de sódio, sacarina sódica, glicerol, sorbitol, álcool etílico, álcool benzílico, poloxamer 188, povidona, salicilato de metila, eucaliptol, mentol, aroma menta, corante azul FD&C 1, corante amarelo D&C 10 e água deionizada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO

Sanilin é composto por um anestésico tópico (benzocaína) e por um antisséptico (cloreto de cetilpiridínio), utilizado para o alívio rápido e temporário das dores e irritações da boca e garganta.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e proteger da luz e umidade.

PRAZO DE VALIDADE

Vide cartucho. Ao adquirir o medicamento confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do produto. Nunca use medicamento com o prazo de validade vencido, pois pode ser prejudicial à sua saúde.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na

vigência do tratamento ou após seu término ou se estiver amamentando.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO

Siga corretamente as instruções do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO

Não interromper ou modificar o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como reações alérgicas. Este produto é geralmente bem tolerado nas doses recomendadas. Têm sido relatados raros casos de reações alérgicas e inflamação das mucosas.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS

Este medicamento não deve ser utilizado juntamente com gorduras do leite e ovos.

CONTRA INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis como reações de hipersensibilidade, dermatites e metahemoglobinemia (em crianças). O produto é contra-indicado para pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula. Pacientes idosos: a sensibilidade dos pacientes idosos pode ser alterada com a idade, por isso recomenda-se o uso sob orientação médica. Não engolir as pastilhas e sim chupá-las, lentamente, a fim de permanecer o maior tempo possível em contato com a garganta inflamada. O efeito anestésico é desejável e esperado, devendo persistir por tempo determinado. A não ser por indicação médica, o produto não deve ser administrado a crianças com menos de 6 anos de idade. Se a dor da boca ou da garganta for grave, persistir por mais de 2 dias, acompanhada de febre, dor de cabeça, náusea ou vômito, procure orientação médica. Este produto deve ser usado com cuidado se a mucosa estiver muito traumatizada. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: AS PASTILHAS CONTÊM AÇÚCAR. SOLUÇÃO NÃO CONTÉM AÇÚCAR.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

O cloreto de cetilpiridínio possui propriedades anti-sépticas. Detém ou inibe o crescimento dos microorganismos presentes, com notável poder de penetrabilidade nos tecidos atingidos pelos estados infecciosos.

A benzocaína é um anestésico local utilizado no alívio da dor de mucosa e pele. Sua ação resulta de sua capacidade de deprimir os impulsos oriundos de nervos aferentes da pele, superfícies de mucosa e músculos do Sistema Nervoso Central. A absorção é mínima. O início do efeito é de 15 a 20 minutos (na mucosa).

INDICAÇÕES

Alívio rápido e temporário das dores e irritações da boca e da garganta provocadas por faringites, amigdalites, estomatites, resfriados e por procedimentos odontológicos e pequenas cirurgias da boca e da garganta.

CONTRA-INDICAÇÕES

O medicamento é contra indicado em pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula, anestésicos locais, na gravidez e lactação.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Não engolir as pastilhas e sim chupá-las, lentamente, a fim de permanecer o maior tempo possível em contato com a garganta inflamada. O efeito anestésico é desejável e esperado, devendo persistir por tempo determinado.

A não ser por indicação médica, o produto não deve ser administrado a crianças com menos de 6 anos de idade. Se a dor da boca ou da garganta for grave, persistir por mais de 2 dias, acompanhada de febre, dor de cabeça, náusea ou vômito, procure orientação médica. Este produto deve ser usado com cuidado se a mucosa estiver muito traumatizada.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: AS PASTILHAS CONTÊM AÇÚCAR.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Anestésicos locais como a benzocaína, interagindo com procarbazina, provocam efeitos hipertensivos, sendo recomendado não administrar simultaneamente. Anestésicos locais interagindo com piridostigmina ocasionam diminuição do efeito da piridostigmina em pacientes com miastenia gravis. Logo, deve-se evitar administração conjunta. Se isso não for possível, fazê-lo com extrema cautela. Reajustar (aumentar) a dose de neostigmina, se necessário. Anestésicos locais interagem com colinérgicos de ação indireta, interferindo no efeito colinérgico em pacientes miastênicos. Portanto, deve-se administrar com precaução, aumentando a dose em pacientes miastênicos. As gorduras presentes no leite e ovos antagonizam os efeitos do cloreto de cetilpiridínio.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como reações alérgicas. Este produto é geralmente bem tolerado nas doses recomendadas. Têm sido relatados raros casos de reações alérgicas e inflamação das mucosas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Para adultos e crianças acima de 6 anos de idade:

PASTILHAS: deixar dissolver na boca uma pastilha, sem mastigar, sempre que necessário, não excedendo 6 pastilhas por dia (ou segundo critério médico).

SPRAY: fazer 3 a 6 nebulizações na área afetada. Repetir o procedimento a cada 2 a 3 horas quando necessário, até o máximo de 6 vezes ao dia. **Sanilin Spray** deve ser usado conforme a posologia acima e somente na área afetada, não devendo ingerir-se o excesso.

Para o bom funcionamento do vaporizador, após o uso de **Sanilin Spray**, limpar cuidadosamente o orifício do atuador com um lenço de papel ou pano limpo e recolocar a tampa. Em caso de não funcionamento do spray, remover o atuador e mergulhá-lo em água morna por alguns instantes, recolocando-o em seguida. Pressionar o atuador sobre o frasco, até que o produto seja pulverizado novamente e recolocar a tampa após o uso.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

SUPERDOSAGEM

Não foram relatados casos de superdosagem. Se a dor de garganta persistir por mais de 2 dias, procure orientação médica.

PACIENTES IDOSOS

A sensibilidade dos pacientes idosos pode ser alterada com a idade. Por isso, recomenda-se o uso sob prescrição médica.

DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E LOTE

Vide cartucho.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.



SAC 0800 7049001
www.kleyhertz.com.br

KLEY HERTZ S.A - Indústria e Comércio
Rua Com. Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS
Farmacêutica Responsável: Paula Carniel Antônio
CRF-RS 4228 - Reg. no M.S. nº: 1.0689.0151
C.N.P.J.: 92.695.691.0001-03 - Indústria Brasileira

030108

030108