



nitrato de miconazol

"Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999"



FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÃO

Loção de nitrato de miconazol 20mg/g.

Cartucho com 1 frasco de 30g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama de loção contém:

nitrato de miconazol.....20mg

Excipiente q.s.p.....1g

(poliawax, metilparabeno, propilparabeno, propilenoalcol, butilhidroxianisól, vaselina líquida, miristato de isopropila, aroma de primula e água purificada)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Nitrato de miconazol loção tem como princípio ativo o nitrato de miconazol que age contra fungos causadores de infecções na pele, inibindo uma atividade essencial das células desses fungos e provocando a sua morte. Alivia rapidamente a coceira que é um sintoma comum dessas infecções.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Nitrato de miconazol loção é indicado para tratamento tópico de infecções de pele (dermatomycoses superficiais) e unhas (onicomicoses) causadas por fungos suscetíveis incluindo cândida (monília). Micoses de pele, tais como: tineaas de corpo, tineaas do pé (pé de atleta e friteira), tinea da mão (micose da mão), tinea da virilha (micose da virilha), dermatite perianal (dermatite de fraldas), pitiríase versicolor (pau branco ou micose da praia).

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-indicações

Não utilize nitrato de miconazol loção se você tiver hipersensibilidade (alergia) ao nitrato de miconazol ou aos outros componentes da fórmula.

Advertências

Se ocorrer alguma reação sugerindo alergia ou irritação, o tratamento deve ser interrompido.

Gravidez e amamentação

Nitrato de miconazol é pouco absorvido pelo corpo quando aplicado na pele. A excreção no leite humano de miconazol é desconhecida. Se você está grávida ou amamentando, consulte seu médico se você pode usar nitrato de miconazol loção.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Precauções

Não utilize nitrato de miconazol loção na região dos olhos.

Lave bem as mãos após usar nitrato de miconazol loção, exceto se o tratamento for nas mãos.

Mantenha uma toalha e uma esponja para banho para uso próprio, pois isso evita a infecção de outras pessoas. Troque regularmente a roupa que fica em contato com a pele infectada para evitar a reinfecção.

Interações medicamentosas

Se você utiliza anticoagulantes orais (medicamentos que "afinam" o sangue), como varfarina, consulte seu médico antes de usar nitrato de miconazol loção.

Os efeitos terapêuticos e adversos de outros medicamentos podem aumentar com o uso concomitante de miconazol. Consulte seu médico antes de usar nitrato de miconazol, se você utiliza qualquer outro medicamento.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

O prazo de validade deste medicamento é 24 meses após a data de fabricação impressa na sua embalagem.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto Físico

A loção de nitrato de miconazol possui cor branca, isenta de partículas sólidas.

Características Organolépticas

Loção com aroma artificial de primula.

Dosagem

Infecções de pele: Aplique um pouco de loção sobre as lesões, uma ou duas vezes ao dia. Fricione a loção na pele com os dedos até que tenha penetrado completamente. A duração da terapia varia de 2 a 6 semanas dependendo da localização e gravidade da lesão. O tratamento deve continuar ao menos uma semana após o desaparecimento de todos os sinais e sintomas.

Infecções de unha: As unhas infectadas devem ser cortadas tão curtas quanto possível. Uma porção de loção deve ser aplicada e fricionada sobre e abaixo da unha infectada e também na área próxima, uma a duas vezes ao dia. A unha tratada deve ser coberta com um curativo oclusivo. O tratamento não deve ser descontinuado até que uma nova unha cresça e a cura definitiva possa ser observada (raramente ocorre em menos de 3 meses).

Como usar

Lave e seque bem o local infectado. Aplique nitrato de miconazol gentilmente na pele com a ponta dos dedos. Não trate apenas a pele infectada, aplique o produto também na área ao redor.

Se a área infectada não for as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação da loção. Isto é muito importante para evitar a transferência dos germes da pele infectada para outras partes do corpo ou para outras pessoas.

Para um tratamento bem sucedido, aplique nitrato de miconazol loção todo dia. Não pare de usar o medicamento até uma semana após o desaparecimento dos sintomas. Dependendo do tipo e extensão da infecção, o tratamento pode durar de 2 a 6 semanas.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Nitrato de miconazol loção é geralmente bem tolerado. Em casos raros, vermelhidão, irritação, leve sensação de queimação ou coceira podem acontecer no local de aplicação do nitrato de miconazol loção. Em tais casos, geralmente é suficiente evitar uma ou algumas aplicações.

Hipersensibilidade (alergia) ao nitrato de miconazol é muito rara e pode ser reconhecida por coceira, vermelhidão, respiração curta e/ou inchaço do rosto após aplicação. Nesses casos pare o tratamento e consulte seu médico.

Não hesite em relatar qualquer outro efeito indesejável ao seu médico.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Quando o uso de nitrato de miconazol é mais frequente do que o prescrito, pode ocorrer vermelhidão, inchaço ou sensação de queimação.

Neste caso, é suficiente evitar a utilização por uma ou duas aplicações e após, voltar a utilizar nitrato de miconazol de acordo com o esquema prescrito.

A ingestão acidental de pequena quantidade de nitrato de miconazol normalmente não faz mal. Contudo, para ter certeza que não há problemas, consulte seu médico.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Nitrato de miconazol loção deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), mantendo o frasco devidamente fechado.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



MULTILAB Ind. e Com. de Prod. Farm. Ltda.

RS 401 - Km 30 - nº 1009 - São Jerônimo - RS

CEP 96700-000 - CNPJ: 92.265.552/0001-40

Data de fabricação, lote e validade: vide embalagem

Reg. MS. Nº 1.1819.0071

Farm. Resp.: Almeici Lucia Werle Cavedon - CRF/RS. Nº 5202

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Venda Sem Prescrição Médica

SAC:

0800 600 0660

700697

Rev.01
26/08/10

