

SUPERDOSAGEM

Cuidados especiais devem ser empregados quando um excesso do produto for instilado no olho, tais como: lavá-lo com água ou soro fisiológico. Se acidentalmente for ingerido, aconselha-se beber bastante líquido para provocar diluição.

PACIENTES IDOSOS

Deve-se ter cautela na administração em pacientes idosos com graves problemas cardiovasculares como arritmia e hipertensão, pois pode ocorrer exacerbação destas condições.

"Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas procure orientação médica."

Reg. MS-1.0404.1919.001-1

Farm. Resp.: Christian Gregory Burgos de Menezes - CRF-SP nº 30.098

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-551066

Nº de lote, Data de fabricação, Prazo de validade: Vide cartucho.

FABRICADO POR:

ACCO SCIENCE FARMACÊUTICA LTDA - EPP

Av. Ipanema, 4320 • Sorocaba - SP
CEP: 13071-801 • CNPJ: 06.893.666/0001-00
INDÚSTRIA BRASILEIRA

REGISTRADO POR:

LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039-A • Bragança Paulista - SP
CEP: 12929-600 • CNPJ: 61.299.111/0001-35
INDÚSTRIA BRASILEIRA

4

COLÍRIO BLUMEN®

cloridrato de nafazolina
sulfato de zinco



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução oftálmica: Frasco contendo 20 mL.

USO ADULTO (acima de 12 anos de idade).

USO OFTÁLMICO

Composição

Cada mL contém:

cloridrato de nafazolina 0,15 mg
sulfato de zinco 0,30 mg
excipientes: cloreto de benzalcônio,
cloreto de sódio, citrato de sódio
dihidratado, polissorbato 80 e água
purificada q.s.p 1,0 mL

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO

Descongestia os olhos vermelhos, aliviando as irritações.

Cuidados de armazenamento
Proteger da luz e umidade.

Prazo de validade

Vide cartucho. Ao adquirir o medicamento confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do produto.

"Nunca use medicamento com prazo de validade vencido, pois pode ser prejudicial à sua saúde."

Gravidez e lactação

"Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término."

"Informar ao médico se está amamentando."

Cuidados de administração: instilar o colírio no canto do olho, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Remover as lentes de contato antes de instilar o colírio.

GL 6076 B

1

Reações adversas

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dilatação pupilar, aumento da pressão intraocular, dor de cabeça, pressão alta, náusea, sudorese, fraqueza, aumento da irritação ocular, hipertiroidismo.

Se a irritação persistir ou aparecer dor, consulte um oftalmologista.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

Contraindicado para pacientes com hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula. Não use em casos de glaucoma de ângulo estreito ou doenças oculares graves. Não use se estiver se medicando com um inibidor da monoaminoxidase (MAO).

"Não tome medicamento sem o conhecimento do seu médico, pode ser perigoso para a saúde."

"Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde."

"Não usar em crianças menores de 12 anos."

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Farmacodinâmica

O cloridrato de nafazolina, um agonista imidazólico alfa-adrenérgico, é largamente empregado em oftalmologia devido a sua ação vasoconstritora. O sulfato de zinco é um adstringente ocular. O produto descongestia os olhos vermelhos, aliviando as irritações.

Farmacocinética

Foi relatada absorção sistêmica após aplicação tópica de soluções de nafazolina. A nafazolina não é usada sistemicamente, porém é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal. O grau de absorção de zinco tópico é influenciado pela base na qual o componente zinco está contido e pelas condições da pele (intacta ou lesada).

INDICAÇÕES

Solução oftálmica adstringente para o tratamento das irritações oculares (poeira,

vento, calor, fumaça, gases irritantes, luz e corpos estranhos).

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado para pacientes com hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

Não use em casos de glaucoma de ângulo estreito ou doenças oculares graves.

Não use se estiver se medicando com um inibidor da MAO.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Este colírio deve ser usado com precaução em pacientes com problemas cardiovasculares, no diabetes, na hipertensão, no hipertiroidismo devido à nafazolina.

Remover as lentes de contato antes de instilar o colírio.

"Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde."

"Não usar em crianças menores de 12 anos."

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso concomitante deste colírio é desaconselhável em casos em que o paciente esteja fazendo uso de um medicamento com ação inibidora da MAO.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dilatação pupilar, aumento da pressão intraocular, dor de cabeça, hipertensão, náusea, sudorese, fraqueza, aumento da irritação ocular, hipertiroidismo.

Se a irritação persistir ou aparecer dor, consulte um oftalmologista.

POSOLOGIA

Instilar 1 ou 2 gotas sobre o olho afetado, quando necessário, até 4 vezes ao dia. Se a irritação persistir ou se sentir dores oculares ou alteração na visão, consulte o médico.

Modo de usar

1. Recline a cabeça para trás com os olhos fechados, aproxime o gotejador no canto do olho.

2. Aperte levemente o frasco plástico, para gotejar o produto. Abra e feche os olhos duas ou três vezes.

2

3

LUPER IND. FARMACÊUTICA LTDA

PRODUTO: Colírio Blumen

FACA: 105 x 150 mm

VERSÃO: GL 6076 B Acco - PC ILUSTRATOR 11.0

288 C