

# Fitoscar

## Bula de Fitoscar

Bula do remédio **Fitoscar**. Classe terapêutica dos **Cicatrizantes**. Princípio ativo **Stryphnodendron Adstringens (mart.) Coville**.

## Indicações de Fitoscar

O medicamento FITOSCAR, extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, está indicado como agente cicatrizante em vários tipos de lesões.

## Efeitos Colaterais de Fitoscar

Não foram relatadas quaisquer reações adversas ao uso estabelecido do produto.

Pacientes com transtornos na tireóide devem consultar um especialista antes de fazer uso deste medicamento.

**ATENÇÃO:** Este produto é um novo medicamento e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, podem ocorrer efeitos indesejáveis não conhecidos. Se isto ocorrer, o médico responsável deve ser comunicado.

## Advertências

Em caso de hipersensibilidade ao produto, descontinuar o uso e comunicar ao médico o mais breve possível.

Pacientes com transtornos na tireóide devem consultar um especialista antes de fazer uso deste medicamento.

### Gravidez e lactação

Não há estudos adequados e bem-controlados sobre a segurança do extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville em mulheres grávidas. A administração de FITOSCAR [extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville] na gravidez ou durante o período de amamentação não é recomendada, exceto sob supervisão médica.

### Interferência em exames laboratoriais

Não há relato de interferência do extrato seco de extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville em exames laboratoriais.

## Apresentação

Pomada de 60 mg/g. bisnagas contendo 10, 15, 20, 30 e 50 g.

## Composição

Cada g da pomada contém:

Extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville a 50% 60 mg

Excipientes\* qsp 1 g

\*Excipientes: polietilenoglicol, propilenoglicol, metilparabeno e propilparabeno.

Correspondência em marcador:

60 mg do extrato seco de *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville correspondem a 30 mg de fenóis totais e 27 mg de taninos totais.

Parte da planta utilizada: Casca

## Contraindicações

O produto FITOSCAR [extrato seco de *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville] é contra-indicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

O produto FITOSCAR [extrato seco de *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville] é contra-indicado em escaras em estágio III e IV: necrose de tecido com comprometimento de ossos ou estruturas de suporte (tendão, cápsulas, etc.) segundo a classificação do Quick Reference Guide for Clinicians. Hipótese de osteomielite, artrite séptica ou celulite avançada. Em feridas com indicação de debridamento com a presença de septicemia, febre sem foco evidente, taquicardia, deterioração do estado mental, endocardite bacteriana em atividade. Estado geral muito comprometido como desnutrição grau IV, caquexia, crises de hipotensão, paciente acamado durante longos períodos.

## Interações Medicamentosas

Não há relatos de interações com outros medicamentos.

Interações com alimentos

Não há relatos de interações com alimentos.

## Modo de Uso

O produto FITOSCAR [extrato seco de *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville] é apresentado na forma de pomada de 60 mg/g.

O produto é de uso tópico.

Adulto: Realizar a aplicação da pomada de 2 a 3 vezes ao dia, conforme descrito acima no item "Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto".

## Superdosagem

Em caso de superdose, o médico deverá ser contatado urgentemente ou o paciente deverá ser encaminhado ao pronto atendimento mais próximo para procura de socorro médico.

## Uso em Idosos

Geriatría

As doses e cuidados para pacientes idosos são as mesmas recomendadas para os adultos, devendo ter o acompanhamento médico.

