# XILODASE®

*lidocaína, sulfato de neomicina e hialuronidase*

## Formas farmacêuticas, via de administração e apresentações:

**Uso externo**

Pomada tópica contendo 50 mg de lidocaína, 5 mg de sulfato de neomicina e 50 UTR de hialuronidase. Bisnagas com 15 g e 30 g (acompanhada de aplicadores e dedeiras descartáveis).

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

## Indicações do Medicamento

Nas afecções do trato ano-retal, XILODASE (lidocaína, sulfato de neomicina e hialuronidase) está indicada no tratamento das hemorróidas, fissura e prurido anal e no pós-operatório de hemorroidectomia.

No tratamento das irritações da pele e das infecções cutâneas causadas por germes sensíveis à ação da neomicina.

## Contra-Indicações

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

## Precauções e Advertências

O uso tópico de antibiótico pode, ocasionalmente, favorecer o crescimento de microorganismos não suscetíveis, como fungos.

Excepcionalmente poderão ocorrer casos de sensibilidade.

## Interações Medicamentosas

XILODASE (lidocaína, sulfato de neomicina e hialuronidase) não deve ser aplicada com outros produtos, pois a sua ação pode ser prejudicada. Os curativos, quando usados no pós-operatório, devem ser feitos antes da aplicação da pomada.

## Reações Adversas

Ainda não são conhecidas a intensidade e freqüência das reações adversas.

## Posologia

Uso tópico: Deve ser aplicada a intervalos regulares, durante o dia, de preferência. Se a superfície a tratar estiver aberta, ou houver cisão da pele, deve-se usar a pomada em pequenas camadas de cada vez, pois o seu efeito não depende da quantidade empregada e sim da continuidade do tratamento, que deve ser renovado à medida que se tornar necessário em cada caso.

Afecções internas (ano-retal): aplicação profunda de pomada, após evacuação prévia, 2 ou 3 vezes ao dia, até melhora dos sintomas; continuar o tratamento com uma aplicação, de preferência ao deitar.

**Instrução de uso (Aplicação retal):**

Retire a tampa da bisnaga e atarraxe o aplicador, introduzindo-o a seguir, delicadamente, no ânus. Através de leve pressão sobre a bisnaga, a pomada flui uniformemente; e tampar novamente a bisnaga. Lavar o aplicador com água quente e sabão, enxaguando-o com álcool.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR;**
**NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**Reg. MS nº 1.0118.0037**

**APSEN FARMACÊUTICA S/A**

**XILODASE® é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula.**

Este produto faz parte das linhas Apsen: