

# LEGALON

## Produto Fitoterápico

Drágeas 70 mg - Cápsulas 140 mg - Suspensão

- Apresentações:

Drágeas : embalagens com 30 unidades

Cápsulas : embalagens com 20 unidades

Suspensão: frascos com 100 ml

Uso Adulto ou Pediátrico

## Composições - LEGALON

Cada drágea contém: Extrato seco de Cardo\* (36-44 : 1) 86,5 a 93,3 mg  
(equivalente a 70 mg de Silimarina)

Excipiente q.s.p. 1 drágea

Cada cápsula contém:

Extrato seco de Cardo\* (36-44 : 1) 173,0 a 186,7 mg

(equivalente a 140 mg de Silimarina)

Excipiente q.s.p. 1 cápsula

Cada colher das de chá (5 ml) contém:

Extrato seco de Cardo\* (36-44 : 1) 61,8 a 66,7 mg

(equivalente a 50 mg de Silimarina)

Veículo q.s.p. 5 ml

\* Extrato padronizado para conter entre 75,0 e 80,9% de Silimarina, que é uma mistura de compostos flavonóides: silibinina, isosilibinina, silidianina e silicristina.

## Concentração do Princípio Ativo - LEGALON

Cada Drágea contém 70 mg de Silimarina, calculados como Silibinina.

Cada Cápsula contém 140 mg de Silimarina, calculados como Silibinina.

Cada 5 ml da Suspensão contém 50 mg de Silimarina, calculados como Silibinina.

## Nomenclatura botânica e parte utilizada da planta - LEGALON

*Carduus marianus* L. (Compositae), fruto.

- Informação ao Paciente

Conserve o produto na embalagem original e ao abrigo do calor.

Prazo de Validade: 36 meses para Drágeas e Cápsulas e 24 meses para Suspensão (vide cartucho). Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez ou lactação na vigência do tratamento.

Cuidados de administração: Agite o frasco da Suspensão antes de usar.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico caso apareçam reações desagradáveis como diarreia, dores de estômago ou reações alérgicas cutâneas.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade ao componente da fórmula.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

#### **- Informação Técnica**

A Silimarina, componente ativo do **Legalon**, age como estabilizador das membranas dos hepatócitos, resguardando sua integridade e, assim, a função fisiológica do fígado; protege, experimentalmente, a célula hepática da influência nociva de substâncias tóxicas endógenas e/ou exógenas.

Desta maneira, **Legalon** atua de forma benéfica como coadjuvante no tratamento das doenças hepáticas crônicas inflamatórias, cirrose hepática e lesões hepatotóxicas, promovendo rápida melhora dos sintomas clínicos, como cefaléia, astenia, anorexia, distúrbios digestivos, sensação de peso epigástrico, etc.

Em animais, a Silimarina demonstrou acelerar a regeneração do parênquima hepático, aparentemente aumentando a síntese de RNA no fígado.

#### **Indicações - LEGALON**

No tratamento dos distúrbios digestivos funcionais que ocorrem nas hepatopatias.

#### **- Contra-Indicações:**

Hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

#### **Precauções - LEGALON**

Não há.

#### **Interações Medicamentosas - LEGALON**

Até o momento não foram relatados casos de interação medicamentosa com o uso do produto.

#### **- Reações Adversas:**

*Foram relatados raros casos de gastralgias e episódios diarreicos. Excepcionalmente podem ocorrer reações alérgicas cutâneas.*

#### **- Posologia:**

Conforme a gravidade dos sintomas, recomenda-se:

**Legalon 70** (Drágeas): 1 a 2 drágeas, três vezes ao dia, após as refeições, durante 5 a 6 semanas.

**Legalon 140** (Cápsulas): 1 a 3 cápsulas ao dia, após as refeições, durante 5 a 6 semanas.

#### **Legalon Suspensão AGITE ANTES DE USAR:**

Crianças de 10 a 15 kg: 2,5 ml (1/2 colher das de chá), 3 vezes ao dia.

Crianças de 15 a 30 kg: 5 ml (1 colher das de chá), 3 vezes ao dia.

Adolescentes: 7,5 ml (1 1/2 colher das de chá), 3 vezes ao dia.

Adultos: 10 ml (2 colheres das de chá), 3 vezes ao dia.

Nos casos mais graves, e a critério médico, estas doses podem ser aumentadas.

#### **Conduta na Superdosagem - LEGALON**

Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

