



Substância Ativa

cloreto de sódio + citrato de potássio + citrato de sódio + glicose

Indicação

Indicado para reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação), ou para a manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em quadros de doença diarreica aguda, de qualquer etiologia, tanto em crianças como em adultos.

Detalhes do Produto

Registro no Ministério da Saúde: 1.0639.0162
HIDRAFIX®

cloreto de sódio, cloreto de potássio, citrato de sódio, glicose
Leia com atenção, antes de usar o produto.
Forma farmacêutica, apresentações e via de administração
Solução hidratante pronta para beber. Frascos com 250 ml, nos sabores framboesa, laranja e uva. Uso oral.

USO	PEDIÁTRICO	E	ADULTO
Composição			
Cada	ml	da	solução contém:
Cloreto de sódio		2,34 mg
Cloreto de potássio		1,49 mg
Citrato de sódio		1,96 mg
Glicose		19,83 mg
Veículo aromatizado	q.s.p.	1 ml
Cada 1000 ml proporciona 60 mEq de sódio, 20 mEq de potássio, 60 mEq de cloreto, 20 mEq de citrato e 110 mEq de glicose.			

Excipientes: Sabor framboesa: ácido benzóico, ácido sórbico, sacarina sódica, água purificada, aroma de framboesa e corante vermelho Ponceau 4R. Sabor laranja: ácido benzóico, ácido sórbico, sacarina sódica, água purificada, aroma de laranja e corante amarelo crepúsculo. Sabor uva: ácido benzóico, ácido sórbico, sacarina sódica, água purificada, aroma de uva, corante vermelho Ponceau 4R e corante azul brilhante.

INFORMAÇÕES

AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento
A ação esperada deste medicamento é prevenir a desidratação ou manter a recuperação de água e sais que se conseguiu na reidratação.
Cuidados de armazenamento
Conserve o produto na embalagem original e à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Prazo de validade
O prazo de validade está impresso na embalagem do produto. Após abertura do frasco, o produto deve ser mantido em local fresco, devendo ser utilizado dentro de 24 horas. Passado esse prazo, o que restar da solução deve ser eliminado e, se necessário, abrir novo frasco. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde.

Gravidez e lactação
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se estiver amamentando.

Cuidados de administração
Hidraix® "pronto para beber" deve ser administrado à vontade, mas intercalando-se com outros líquidos (água, sucos, chás, leite, sopas), por um ou dois dias, ou pelo tempo que o médico indicar. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas
Ainda não foram relatadas reações adversas com o uso do produto. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Leia com atenção as "Contra-indicações" e "Precauções"; em caso de dúvida, consulte seu médico.

Contra-indicações e precauções
Não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Atenção diabéticos: contém açúcar.
Riscos da automedicação: **NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

Como evitar a diarreia e a desidratação
A diarreia e a desidratação podem ser evitadas com cuidados de higiene: lave bem as mãos e os seios antes de amamentar; lave bem as mãos e os utensílios antes de preparar a comida; toda a louça onde a criança come deve ser bem limpa; mantenha os alimentos protegidos do calor e cobertos, para evitar insetos e pó.
Em dias de calor, vista a criança com roupas leves e ofereça líquidos à vontade. O leite materno é o melhor alimento para crianças pequenas e ajuda a evitar diarreia e desidratação; amamente seu filho sempre que possível.

INFORMAÇÕES

Características

Hidraix® é um medicamento

TÉCNICAS