

MUCOLITIC® carbocisteína

NYCOMED

Leia com atenção, antes de usar o produto.

Forma farmacêutica, apresentação e via de administração

Solução oral - Gotas. Frascos com 20 ml. Uso oral.

USO PEDIÁTRICO

Outras formas farmacêuticas e apresentações

Granulado adulto. Embalagens com 15 envelopes.

Xarope adulto. Frascos com 100 ml.

Xarope pediátrico. Frascos com 100 ml.

Composição

Cada ml (20 gotas) da solução oral contém:
Carbocisteína 50 mg
Veículo q. s. p. 1 ml
Veículo: ácido cítrico, sacarose, álcool etílico, benzoato de sódio, edetato dissódico diidratado, corante azul brilhante, corante vermelho Ponceau 4R, corante amarelo crepúsculo, essência artificial de baunilha, essência artificial de cereja, essência artificial de framboesa, hidróxido de sódio e água filtrada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

Mucolitic® ajuda a diminuir a produção das secreções respiratórias, assim como deixa as secreções menos espessas, facilitando sua eliminação pelo organismo, quando há um excesso destas secreções por doenças respiratórias. Mucolitic® começa a fazer efeito cerca de 1 a 2 horas após a sua administração.

Por que este medicamento foi indicado?

Mucolitic® ajuda no tratamento de problemas respiratórios, quando há um excesso de secreções que podem piorar o estado do paciente.

Quando não devo usar este medicamento?

Contra-indicações

O produto não deve ser utilizado por pa-

cientes com úlceras no estômago ou no duodeno ou com alergia aos componentes da formulação.

Advertências

O tratamento com Mucolitic® não substitui o tratamento específico das doenças respiratórias, como a bronquite, a asma ou as infecções dos pulmões.

Atenção diabéticos: Mucolitic® Solução oral (gotas) contém açúcar.

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária inferior a 2 anos de idade.

Precauções

Gravidez e lactação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

Pacientes idosos

Não existem restrições ou precauções especiais com relação ao uso do produto por pacientes idosos.

Interações medicamentosas

Ingestão juntamente com outras substâncias

Durante o tratamento com Mucolitic®, você não deve fazer uso de medicamentos que inibem a tosse como os antitussígenos, bem como não deve fazer uso de medicamentos atropínicos (como por exemplo, atropina).

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Como devo usar este medicamento?

Aspecto físico

Mucolitic® Solução oral (gotas) é um líquido límpido, viscoso e de cor alaranjada.

Características organolépticas

Mucolitic® Solução oral (gotas) possui odor e sabor de framboesa e cereja.

Leia com atenção o item “Modo de usar” para a utilização correta do produto.

Modo de usar:

Crianças entre 2 e 12 anos de idade: 2 gotas/kg de peso de Mucolitic® Solução oral (gotas), o que equivale a 5 mg de carbocisteína/kg de peso, 3 vezes ao dia.

Para crianças entre 5 e 12 anos aconselha-se o uso de Mucolitic® Xarope pediátrico, devido à maior facilidade de administração e adequação da dose para essa faixa etária.

Atenção: o frasco de Mucolitic® Solução oral (gotas) vem acompanhado de um novo tipo de gotejador, moderno e de fácil manuseio.



Romper o lacre da tampa.



Virar o frasco e mantê-lo na posição vertical. Para começar o gotejamento, bater levemente com o dedo no fundo do frasco.

Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

O prazo de validade está impresso na embalagem do produto.

Quais os males que este medicamento pode causar?

Às vezes, este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis como: dor no estômago, enjôo, diarreia, sangramento no estômago ou intestinos, alergia na pele, tontura, insônia, dor de cabeça, palpitação e leve diminuição da taxa de açúcar no sangue. Informe ao seu médico o aparecimento

destas ou de quaisquer outras reações desagradáveis.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Nestes casos, os sintomas mais comuns que podem aparecer são dor de estômago, enjôo, vômito e diarreia. O médico deve ser imediatamente comunicado e, provavelmente, deverá ser feita uma lavagem gástrica, devendo o paciente ser mantido sob cuidadosa observação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Conserve o produto na embalagem original e à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MS - 1.0639.0202

Farmacêutico Responsável:

Wagner Moi - CRF-SP nº 14.828

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho.

Nycomed Pharma Ltda.

Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5

Jaguariúna - SP

CNPJ 60.397.775/0008-40

Indústria Brasileira

MUSO_0799_0709_C_P

Cód. Laetus: 21

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE

SAC: 0800-7710345

www.nycomed.com.br

Cód.: 1032825

150x210 mm