

Leia com atenção, antes de usar o produto.

Nenê dent[®] N

Matricaria chamomilla tintura, cloridrato de lidocaína, polidocanol

NÃO CONTÉM CONSERVANTES

SEM AÇÚCAR

Formas farmacêuticas, apresentações e via de administração

Gel. Bisnagas com 10 g.

Solução. Frascos com 10 g.

Uso tópico.

USO PEDIÁTRICO

Composição

Cada grama do **gel** contém:

Cloridrato de lidocaína.....3,4 mg

Polidocanol 600.....3,2 mg

Tintura de *Matricaria chamomilla*.....150,0 mg

Excipientes q.s.p. 1,0 g

Excipientes: propilenoglicol, xilitol, sorbitol, edetato dissódico, carbômer, hidróxido de sódio, polissorbato 20, sacarina sódica, mentol e água purificada.

Cada grama da **solução** contém:

Cloridrato de lidocaína.....3,4 mg

Polidocanol 600.....3,2 mg

Tintura de *Matricaria chamomilla*.....150,0 mg

Veículo q.s.p..... 1,0 g

Excipientes: glicerol, xilitol, sorbitol, povidona, polissorbato 20, sacarina sódica, mentol e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Quando devo usar e qual é a ação esperada de Nenê Dent[®] N?

Nenê Dent[®] N deve ser usado para aliviar a dor e a coceira, comuns no surgimento da primeira dentição em crianças. Também apresenta ação antiinflamatória local. Sua formulação, desenvolvida especialmente para

crianças, não contém conservantes ou açúcar, possuindo o xilitol que previne o desenvolvimento de cáries.

Como devo guardar Nenê Dent® N?

Você deve guardar o produto na embalagem original, à temperatura ambiente (15°C a 30°C) e proteger da luz.

Qual é o prazo de validade de Nenê Dent® N?

O prazo de validade está impresso na embalagem do produto. **Após a abertura da embalagem, o prazo de validade do produto é de 1 ano**, desde que dentro do prazo de validade do produto.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde.

Posso usar Nenê Dent® N durante a gravidez e amamentação?

Este produto é indicado para crianças com problemas na dentição. Portanto, considerando indicação específica, restrições e informações quanto a gravidez e lactação não são aplicáveis.

Existe algum cuidado especial para usar Nenê Dent® N?

Siga as orientações quanto ao uso do produto no item "Posologia e modo de usar". Se ocorrer piora ou persistência dos sintomas, procure orientação médica. Evite o contato do produto com os olhos.

Posso interromper o tratamento com Nenê Dent® N?

Sim, você pode interromper o tratamento a qualquer momento. Caso o uso do produto esteja sendo feito sob recomendação médica, não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Podem ocorrer reações adversas desagradáveis com o uso de Nenê Dent® N?

Reações alérgicas ocasionadas pelos componentes da formulação são possíveis de ocorrer. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Quando o bebê está usando Nenê Dent® N, pode-se fazer uso de outras substâncias?

Não existem relatos de que Nenê Dent® N interfira na ação de outros medicamentos. Porém, você deve informar ao médico sobre qualquer medicamento que o bebê esteja usando.

Quando o bebê não deve usar Nenê Dent® N e quando deve utilizá-lo com cuidado?

O produto não deve ser utilizado em casos de alergia conhecida aos componentes da fórmula. Crianças que apresentem febre ou problemas digestivos durante o processo da primeira dentição devem procurar um médico, pois, estes sintomas não estão necessariamente relacionados ao processo de dentição. Em casos de vermelhidão ou inchaço da gengiva ou em casos de outras queixas secundárias concomitantes, procure orientação médica.

Riscos da automedicação: NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características

Nenê Dent[®] N, através da ação dos dois anestésicos locais, cloridrato de lidocaína e polidocanol, alivia a dor e a coceira, comuns no surgimento da primeira dentição em crianças.

A tintura de *Matricaria chamomilla* tem ação antiinflamatória local, contribuindo assim para a ação do produto. Sua formulação, desenvolvida especialmente para crianças, não contém conservantes ou açúcar, possuindo o xilitol que previne o desenvolvimento de cáries.

Nenê Dent[®] N pode ser utilizado até a aparição de toda a primeira dentição (dentes de leite) e, posteriormente, quando surgirem os molares.

Segue abaixo ilustração que demonstra o período (referente à idade da criança) em que determinados dentes são formados durante a primeira dentição:

FORMAÇÃO DOS DENTES NA PRIMEIRA DENTIÇÃO		
INCISIVOS		6 a 12 meses
CANINOS		18 a 24 meses
PRIMEIROS MOLARES		12 a 18 meses
SEGUNDOS MOLARES		24 a 30 meses

Indicações

Para o alívio da dor, prurido e inflamação que surgem durante o processo fisiológico da primeira dentição.

Contra-indicações

Hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Precauções e advertências

Crianças que apresentem febre ou problemas digestivos durante o processo da primeira dentição devem procurar um médico, pois, estes sintomas não estão necessariamente relacionados ao processo de dentição.

Crianças que apresentem casos de vermelhidão ou inchaço da gengiva ou casos de sérias queixas secundárias concomitantes devem procurar um médico.

Evitar o contato do produto com os olhos.

Interações medicamentosas

Até o momento, não foram relatados casos de interações medicamentosas com o uso do produto.

Reações adversas

Reações alérgicas ocasionadas pelos componentes da formulação são possíveis de ocorrer.

Posologia e modo de usar


Nenê Dent® N Gel:

1- Informações para abertura do lacre




**Perfurar o lacre da
bisnaga com o lado
externo da tampa**

2- Aplique uma pequena quantidade de gel, com o auxílio de um dos dedos previamente limpo ou de um chumaço de algodão, sobre a gengiva (local de erupção do dente). Vide ilustrações abaixo. Deve-se fazer 2 ou 3 aplicações ao dia, preferencialmente após as refeições e antes de dormir ou ainda à critério médico.



Nenê Dent® N Solução: mantendo o frasco na vertical para gotejar, aplique uma pequena quantidade da solução, com o auxílio de um dos dedos ou de algodão, sobre a gengiva (local de erupção do dente). Vide ilustrações abaixo.



Deve-se fazer 2 ou 3 aplicações ao dia, preferencialmente após as refeições e antes de dormir ou ainda à critério médico.

Nenê Dent® N pode ser utilizado até a aparição de toda a primeira dentição (dentes de leite) e, posteriormente, quando surgirem os molares.

Superdose

Devido às baixas doses dos componentes ativos, até o momento não existem relatos de superdose com manifestações clínicas.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

MS – 1.0639.0097

Farmacêutico Responsável: Wagner Moi – CRF-SP nº 14.828

N.º do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho.

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE

SAC: 0800-7710345

www.nycomed.com.br

Fórmula original de

Dentinox Gesellschaft fuer Pharmazeutische Praeparate
Berlim – Alemanha



Nycomed Pharma Ltda.

Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5

Jaguariúna- SP

CNPJ 60.397.775/0008-40

Indústria Brasileira

ND00_0706_0707