



No tratamento de *Tinea pedis* (pé de atleta), *Tinea cruris*, *Tinea corporis* e onicomicoses causadas pelo *Trichophyton*, *Epidermophyton* e *Microsporum*; candidíase cutânea, *Tinea versicolor* cromofitose.

**CONTRA-INDICAÇÕES**  
**HIPERSENSIBILIDADE AO MICONAZOL E AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.**

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

**Genéricas:** se ocorrer alguma reação sugerindo hipersensibilidade ou irritação, o tratamento deve ser interrompido. nitrato de miconazol é destinado ao uso externo, devendo ser utilizado com cuidado nas regiões periorbitais, evitando seu contato com os olhos.

Medidas de higiene devem ser adotadas para controlar fontes de infecção e reinfeção.

**Gravidez e lactação:** Não existem relatos de problemas específicos relacionados a mulheres grávidas ou lactantes. "Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista". nitrato de miconazol destina-se ao uso tópico, e não é absorvido sistemicamente, podendo ser utilizado durante a gravidez e a lactação.

**Crianças:** não foram relatados, até o momento, problemas específicos do uso de nitrato de miconazol por crianças.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Não são conhecidas interações do nitrato de miconazol com outras substâncias, quando usados concomitantemente.

**REAÇÕES ADVERSAS**

nitrato de miconazol é geralmente bem tolerado. Existem relatos isolados de irritação ou sensação de queimação associados com a utilização de miconazol. Como ocorre com todas as substâncias de uso cutâneo, pode ocorrer uma reação alérgica ao miconazol ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

**POSOLOGIA**

A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local. Aplique a quantidade recomendada diretamente sobre a região atingida. Ao aplicar nitrato de miconazol, espalhe-o por uma região um pouco maior do que a afetada. Se a área atingida não for nas mãos, lave-as cuidadosamente após aplicação. É recomendável a troca freqüente das roupas que ficam em contato com a área infectada, a fim de evitar a reinfeção. nitrato de miconazol não mancha a pele e nem a roupa.

**Creme:** Em dermatitoses e em infecções por *Candida*, aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área afetada, duas vezes ao dia (pela manhã e à noite).

**Loção cremosa:** Dependendo das lesões, 2 a 4 gotas da loção cremosa sobre a área atingida, 2 a 3 vezes ao dia. O tratamento deve ser ininterrupto e mantido até o completo desaparecimento das lesões, o que ocorre geralmente após 2 a 5 semanas, dependendo da sua extensão. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, o tratamento deve ser mantido por mais uma semana, a fim de evitar recidivas.

**SUPERDOSE**

O uso excessivo pode ocasionar irritação da pele, que desaparece com a descontinuação do tratamento. Em caso de ingestão acidental pode ser utilizado um método de esvaziamento gástrico, a critério médico.

**PACIENTES IDOSOS**

Não há recomendações ou advertências especiais para pacientes idosos (acima de 60 anos de idade), nem evidências que justifiquem o emprego de posologia diferenciada.

Registro M.S. nº 1.0465.0447 (creme dermatológico)

Registro M.S. nº 1.0465.0395 (loção cremosa)

Farm. Responsável: Dr Marco Aurélio Lirio G. Filho - CRF-GO nº 3.524

Nº do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO**

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto Neo Química.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



**Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.**

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

[www.neoquimica.com.br](http://www.neoquimica.com.br)

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira



# nitrato de miconazol

## Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999



**FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES**

Creme dermatológico 20mg/g: Embalagem contendo 1 e 50\* bisnaga(s) com 28g.

Loção cremosa 20mg/mL: Embalagem contendo 1 e 50\* frasco(s) com 30mL.

\*Embalagem hospitalar

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**USO TÓPICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada grama do creme contém:

nitrato de miconazol.....20 mg  
excipientes q.s.p.....1 g  
(uniox A (álcool cetosteárilico + cetete), estearato de sorbitana, petrolato branco, propilenoglicol, miristato de isopropila, álcoois alifáticos de lanolina, fenoxietanol, parabenos, butilidroxitolueno, edetato dissódico, essência de jasmim e água).

Cada mL da loção cremosa contém:

nitrato de miconazol.....20 mg  
excipientes q.s.p.....1 mL  
(uniox A (álcool cetosteárilico + cetete), estearato de sorbitana, petrolato líquido, glicerol, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butilidroxitolueno, hidroxietilcelulose, silicona, essência de jasmim, álcoois alifáticos de lanolina, edetato dissódico, álcool etílico e água).

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

- **Ação esperada do medicamento:** nitrato de miconazol é utilizado para tratamento de diversas micoses superficiais.
- **Cuidados de armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.
- **Prazo de validade: 24 MESES.** Não use medicamento com o prazo de validade vencido; além de não obter o efeito desejado, pode ser prejudicial à sua saúde.
- **Gravidez e lactação:** Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.
- **Cuidados de administração:** A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local. Aplique a quantidade recomendada do medicamento diretamente sobre a região atingida. Ao aplicar, espalhe-o por uma região um pouco maior do que a afetada. Se a área atingida não for nas mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação. É recomendável a troca freqüente das roupas que ficam em contato com a área infectada, a fim de evitar a reinfeção. nitrato de miconazol não mancha a pele e nem a roupa.
- "Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista"
- "Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica".
- **Interrupção do tratamento:** "Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico".
- **Reações adversas:** "Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis". nitrato de miconazol é geralmente bem tolerado. Existem relatos isolados de irritação ou de sensação de queimação associados à utilização de miconazol. Em tais casos, geralmente é suficiente interromper algumas aplicações. Ardor e vermelhidão no local da aplicação podem indicar uma sensibilidade exacerbada (alergia). Neste caso, você deve interromper o tratamento e consultar seu médico.
- **TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".**
- **Contra-indicações e precauções:** o produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. nitrato de miconazol não deve ser utilizado na região dos olhos.
- "Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento".
- **NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE".**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

O miconazol tem atividade antifúngica contra dermatófitos, leveduras e outros fungos. O miconazol inibe a biossíntese do ergosterol no fungo e altera a composição de outros componentes lipídicos da membrana, ocasionando necrose da célula fúngica. Geralmente, o miconazol age rapidamente no prurido (coceira), sintoma que freqüentemente acompanha as infecções por dermatófitos e leveduras. Esta melhora sintomática pode ser observada antes que os primeiros sinais de cicatrização sejam percebidos. O miconazol age no odor desagradável provocado pelas micoses superficiais. O miconazol não produz níveis sanguíneos detectáveis quando aplicado de forma tópica.

**INDICAÇÕES**

