



CONTRA-INDICAÇÕES

ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO NO CASO DE HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO, EM CRIANÇAS PRINCIPALMENTE MENORES DE 12 ANOS E DURANTE A GRAVIDEZ. ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER USADO EM INALOTERAPIA.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Utilizar com cautela em pacientes com problemas cardiovasculares e hipertireoidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática e pacientes que apresentem forte reação a agentes simpatomiméticos, evidenciada por sinais de insônia ou vertigem.

Não deve ser utilizado ininterruptamente durante longos períodos.

O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa, com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase.

O uso concomitante deste medicamento com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina.

Obs: Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada.

REAÇÕES ADVERSAS

Pode ocorrer irritação local passageira (queimação, ardência, espirros). Já foram descritas ocorrências de náuseas e cefaléia.

Pacientes diabéticos podem ter o valor da glicemia elevados com o uso crônico da nafazolina.

O uso crônico deste medicamento pode apresentar congestão nasal por efeito rebote e seu uso prolongado pode acarretar rinite medicamentosa.

POSOLOGIA

Instilar 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia.

SUPERDOSE

Nos casos de superdose, podem ocorrer arritmias cardíacas, cefaléia, náuseas e vômitos, bradicardia, hipotensão ou hipertensão, hiperemia e depressão do Sistema Nervoso Central. Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

PACIENTES IDOSOS

As mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, observando-se as recomendações específicas para grupos de pacientes descritos nos itens "Precauções" e "Contra-indicações".

Registro M.S. nº 1.0465.0442

Farm. Responsável: Dr Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3.524
Nº do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto **Neo Química**.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação,

ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira



cloridrato de nafazolina

Medicamento genérico Lei nº 9.787 de 1999



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução nasal: Embalagens contendo 1 e 50* frascos de plástico gotejador de 30 mL cada.

USO ADULTO

USO NASAL

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução nasal contém:

cloridrato de nafazolina.....0,5 mg

veículo q.s.p. 1 mL

(cloreto de benzalcônio, cloreto de sódio e água purificada)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- **Ação esperada do medicamento:** Age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo, portanto, sua eliminação.

- **Cuidados de armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente entre 15° e 30° C. Proteger da luz.

- **Prazo de validade: 24 MESES.** Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, pode ser prejudicial à sua saúde.

- **Gravidez e lactação:** "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe seu médico se está amamentando".

- **Cuidados de administração:** "Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".

- **Interrupção do tratamento:** "Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".

- **Reações adversas:** "Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: queimação ou ardência".

- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".**

- **Administração concomitante com outras substâncias:** Não deve ser administrado concomitantemente com antidepressivos tricíclicos.

- **Contra-indicações e Precauções:** Este medicamento é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a quaisquer dos componentes da fórmula. Não deve ser administrado em crianças principalmente menores de 12 anos. Deve ser utilizado com cautela em pacientes com problemas cardiovasculares, hipertireoidismo e diabetes.

- Não use ininterruptamente por períodos prolongados.

- O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso. Este medicamento destina-se ao uso tópico nasal.

- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento".

- Não deve ser utilizado durante a gravidez.

- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE".**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cloridrato de nafazolina é um agonista alfa-adrenérgico utilizado como vasoconstritor e descongestionante nasal, com um rápido início de ação vasoconstritora (aproximadamente 10 minutos) e com efeito prolongado (entre 2 a 6 horas).

A administração intranasal da nafazolina leva a um processo de constrição dos vasos dilatados da mucosa nasal, reduzindo o fluxo sanguíneo e o edema tissular. A associação com cloreto de benzalcônio confere ao medicamento uma excelente ação antisséptica, além de atividades emulsificante, ceratolítica e detergente.

O cloreto de benzalcônio é um agente antimicrobiano que é rapidamente absorvido pela mucosa e que possui um rápido início de ação e um tempo de ação antimicrobiana moderadamente longo.

INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado como antisséptico e descongestionante de uso tópico nasal.

