



# cromolerg<sup>®</sup> 2% e 4%

## cromoglicato dissódico

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril a 2% e 4%.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém:

	2%	4%
Cromoglicato dissódico.....	20 mg	40 mg

Veículo: edetato dissódico, cloreto de benzalcônio, ácido clorídrico/ hidróxido de sódio e água purificada q.s.p.

### INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação antialérgica.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Após a abertura do frasco, o produto deve ser consumido no prazo máximo de 15 dias ou rejeitado.
- Gravidez e lactação: informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados na administração: instile a dose recomendada no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

### Informação técnica

As manifestações clínicas de alergia têm sua origem em uma reação anafilática e a consecutiva liberação de mediadores espasmógenos. É justamente inibindo essa liberação de mediadores que atua o cromoglicato dissódico.

A atividade dessa substância é exercida essencialmente em processos devidos a uma reação de hipersensibilidade imediata, agindo também em outras reações anafiláticas e em processos originados pela degranulação de mastócitos.

O cromoglicato dissódico não modifica os efeitos dos mediadores, não estimula os receptores  $\beta$ -adrenérgicos, nem bloqueia o processo de sensibilização. Supõe-se que atua impedindo uma das etapas de degranulação de mastócitos, posterior à fixação antígeno-anticorpo, evitando dessa forma o processo alérgico.

### Indicações

Por sua ação antialérgica, Cromolerg<sup>®</sup> (cromoglicato dissódico) solução oftálmica é indicado no tratamento das afecções alérgicas conjuntivais.

### Contra-Indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

### Precauções e Advertências

Devido à presença do cloreto de benzalcônio, é desaconselhável o uso de lentes de contato durante a utilização do produto.

**Interações Medicamentosas**

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

**Reações Adversas**

A aplicação do produto pode provocar uma sensação de ardência transitória em alguns pacientes, que é considerada normal.

**Posologia**

A concentração e a posologia diária serão estabelecidas a critério médico.

**Superdosagem**

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente, for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

**Pacientes Idosos**

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. ANVISA/ MS - 1.0147.0096

Farm. Resp.: Dra Flávia Regina Pegorer  
CRF-SP nº 18.150

**Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia**

Allergan Produtos Farmacêuticos LTDA  
Av. Guarulhos, 3272 - CEP 07030-000 - Guarulhos -SP  
CNPJ 43.426.626/0009-24  
Indústria Brasileira  
® Marca Registrada

**Texto adaptado à portaria 110/97**

7169BR13P  
Laetus: 30

Serviço de Atendimento ao Consumidor  
**0800-144077**  
Discagem Direta Gratuita