

BUCLINA

Composição - BUCLINA

DICLORIDRATO DE BUCLIZINA.

Posologia e Administração - BUCLINA

1 COMPRIMIDO (ADULTOS) OU MEIO COMPRIMIDO (CRIANCAS DE 6 A 12 ANOS) MEIA HORA ANTES DO ALMOÇO E MEIA HORA ANTES DO JANTAR.

Reações Adversas - BUCLINA

POSSIBILIDADE DE SONOLENCIA DIURNA LEVE, NO INICIO DO TRATAMENTO. - SUPERDOSAGEM: TEORICAMENTE, PODE HAVER **SINAIS** E **SINTOMAS** SEMELHANTES A INTOXICACAO ATROPINICA. A GRAVIDADE DEPENDE DA DOSE INGERIDA. RECOMENDA-SE **LAVAGEM GASTRICA** E SE NECESSARIO ADMINISTRACAO DE FISOSTIGMINA, AO LADO DE MEDIDAS GERAIS DE SUPORTE.

Contra-indicações - BUCLINA

NAO SAO CONHECIDOS OS EFEITOS SOBRE A GESTACAO, E POR ISSO DESACONSELHA-SE O USO EM GRAVIDAS E **LACTANTES**. INTERAGE COM ALCOOL E MEDICAMENTOS DEPRESSORES DO SNC.

Indicações - BUCLINA

ESTIMULANTE DO APETITE.

Apresentação - BUCLINA

COM 20 COMPRIMIDOS DE 25 MG.