

RIFOTRAT Spray

Rifamicina SV sódica

Leia com atenção antes de usar o produto

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES:

Solução tópica: Caixa contendo frasco spray com 20 mL

Apresentação hospitalar: Caixa de embarque contendo 200 frascos com 20 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL contém

Rifamicina SV Sal Sódico.....10 mg
veículos (propilenoglicol, ácido ascórbico, metabisulfito de sódio, edetato dissódico dihidratado, hidróxido de sódio e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento : RIFOTRAT - spray (Rifamicina SV Sal Sódico) é utilizado para tratar infecções de superfície (uso externo), pulverizando a área afetada.

Cuidados de armazenamento: Conservar em temperatura ambiente (15° e 30° C). Proteger da luz. Prazo de Validade: Vide cartucho. Nunca use medicamento com o prazo de validade vencido.

Gravidez e lactação: Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração: Para uma aplicação eficaz, pressione repetidamente a válvula, mantendo o frasco em posição vertical (em pé). Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: Siga as orientações do seu médico para utilizar o medicamento, não interrompendo ou modificando o tratamento sem antes consultá-lo.

Reações Adversas: Podem ocorrer reações alérgicas na pele. Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCENCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e Precauções: Informe seu médico se você tem ou já teve alergia a medicamentos à base de rifamicinas (pessoas alérgicas não devem usar esse medicamento) ou se tem icterícia. "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento".

Modo de uso: Uso externo. Pulverizar a área afetada a cada 6-8 horas ou a critério médico.

Para uma aplicação eficaz, pressione repetidamente a válvula, mantendo o frasco em posição vertical (em pé).

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

A Rifamicina SV é um antibiótico semi-sintético pertencente à classe das Rifampicinas. Apresenta elevado poder bactericida, com atividade tanto contra germes Gram-positivos como Gram-negativos, quando em uso local.

Atua particularmente nas infecções que não respondem ao emprego de outros antibióticos, e mesmo nas causadas pelos estafilococos penicilino-resistentes.

INDICAÇÕES:

Tratamento tópico das infecções de superfície, causadas por microorganismo sensíveis à rifamicina.

- ferimentos e feridas infectadas.
- queimaduras
- furúnculos
- piodermites
- dermatoses infectadas

- úlceras varicosas, pós-flebiticas, ateroscleróticas e diabéticas.
- dermatites eczematóides.
- curativos de feridas pós-cirúrgicas infectadas (adenites, panarícios, supurações de parede).

CONTRAINDICAÇÕES

A Rifamicina Sv está contraindicada a pacientes com antecedentes de hipersensibilidade às rifamicinas.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Em casos de infecções que não respondem com bons resultados após razoável período de tempo, o esquema de tratamento deve ser reavaliado. O uso tópico prolongado pode provocar sensibilização.

Em infecções causadas por estreptococo beta-hemolítico, deve-se comprovar a desaparecimento completa dos microorganismos para evitar outras complicações posteriores.

Deve ser usado com precaução em pacientes com icterícia.

REAÇÕES ADVERSAS

A aplicação tópica de RIFOTRAT spray (Rifamicina SV sal sódico) é geralmente bem tolerada. Podem ocorrer casos de manifestações alérgicas cutâneas, em pacientes sensíveis, que regredem com a suspensão do medicamento e com medidas terapêuticas sintomáticas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Uso externo. Pulverizar a área afetada a cada 6-8 horas ou a critério médico.

Para uma aplicação eficaz, pressione repetidamente a válvula, mantendo o frasco em posição vertical (em pé).

Superdosagem: Não são conhecidos relatos de superdosagem com a administração de Rifamicina SV sódica.

Pacientes idosos: Deve-se seguir as orientações gerais descritas anteriormente.

MS: nº 1.3841.0022.001-6 - Ap. Hospitalar

MS: nº 1.3841.0022.002-4 - Farma

Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Farmacêutico Responsável:

Tales de Vasconcelos Cortes.

CRF-BA nº 3745.

NATULAB LABORATÓRIO S.A

Rua H, N.º 02 Galpão III - Urbis II.

Santo Antonio de Jesus BA

CEP: 44.574-150

CNPJ 02.456.955/0001-83

Indústria Brasileira

SAC: (75) 3311-5555

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Natulab
Laboratório Farmacêutico



75-3311-5555
www.natulab.com.br