

Dequadin®

cloreto de dequalínio

benzocaína

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

DEQUADIN® é apresentado nos sabores menta, laranja e limão. Embalagem com 20 pastilhas.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada pastilha contém:

cloreto de dequalínio.....	0,25 mg
benzocaína	5,00 mg

Excipientes de DEQUADIN® sabor menta: açúcar, cânfora, goma arábica, sacarina, estearato de magnésio, talco, gelatina, aroma de limão, óleo de menta e corante verde folha (composto pelos corantes indigotina e amarelo de tartrazina).

Excipientes de DEQUADIN® sabor laranja: açúcar, cânfora, goma arábica, sacarina, estearato de magnésio, talco, gelatina, vitamina B2 e aroma de laranja.

Excipientes de DEQUADIN® sabor limão: açúcar, cânfora, goma arábica, sacarina, estearato de magnésio, talco, gelatina, aroma de limão em pó, aroma de menta em pó e corante verde folha (composto pelos corantes indigotina e amarelo de tartrazina).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento:

DEQUADIN® é indicado no alívio da dor, da irritação e inflamação das infecções da boca e da faringe, tais como: amigdalites, faringites, estomatites, glossites e aftas.

Cuidados de armazenamento: manter as pastilhas na embalagem original, a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da umidade.

Prazo de validade: o prazo de validade é de 36 meses, após a data de fabricação que se encontra impressa na embalagem externa do produto juntamente com o número do lote. Não utilize medicamentos que estejam fora do prazo de validade,

pois o efeito desejado pode não ser obtido. Informe o seu médico à ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.

NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

DEQUADIN® contém em sua composição o cloreto de dequalínio, que possui ação antisséptica, e a benzocaína, que atua como anestésico de ação tópica.

DEQUADIN® possui sabor agradável, proporciona alívio da dor, irritação e da inflamação provocados, não só pela maioria das infecções comuns da orofaringe, mas também conseqüentes da tosse e rouquidão.

INDICAÇÕES

DEQUADIN® é indicado no alívio da dor, da irritação e inflamação da boca e da faringe, tais como: amigdalites, faringites, estomatites, glossites e aftas.

POSOLOGIA

Dissolver na boca, lentamente, uma pastilha a cada 2 a 3 horas, durante o período inicial do tratamento, aumentando gradativamente o intervalo conforme melhora.

ADVERTÊNCIAS

Este produto nos sabores limão e menta contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

MS: 1.0390.0159

Farm. Resp.:

Dra. Marcia Weiss I. Campos

CRF-RJ nº 4499

Registrado por:

FARMOQUÍMICA S/A

Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.349.473/0001-58



Fabricado por:

FARMOQUÍMICA S.A.

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 033.349.473/0003-10

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.



|
|