

Glibeta

Cloridrato de metformina + Glibenclamida

Composição - Cada comprimido revestido de GLIBETA 500 mg + 2,5 mg contém: Cloridrato de metformina 500 mg; Glibenclamida 2,5 mg. Cada comprimido revestido de GLIBETA 500 mg + 5 mg contém: Cloridrato de metformina 500 mg; Glibenclamida 5 mg.

Indicações - Tratamento de segunda linha em adultos com diabetes tipo 2.

Contraindicações - Hipersensibilidade à metformina, à glibenclamida. Diabetes tipo 1. Insuficiência hepática ou renal. Infecção grave. Desidratação. Cardiopatias. Ataque cardíaco recente. Problemas circulatórios graves. Distúrbios respiratórios. Porfiria. Uso concomitante de miconazol.

Posologia - *Tratamento de segunda linha:* A dose inicial é de 1 comprimido de GLIBETA 500 mg/2,5 mg ou GLIBETA 500 mg/5 mg uma vez ao dia. Para evitar hipoglicemia, a dose inicial não deve exceder as doses diárias que vinham sendo tomadas de metformina e glibenclamida (ou de outra sulfonilureia). *Em substituição ao tratamento anterior com medicamentos antidiabéticos à base de metformina e glibenclamida:* A dose inicial não deve exceder as doses diárias que vinham sendo tomadas de metformina e glibenclamida (ou de outra sulfonilureia). *Aumento de dose:* Um aumento gradual na dose pode ajudar na tolerância gastrointestinal e a evitar a ocorrência de hipoglicemia. *Tratamento de segunda linha:* O aumento da dose não deve exceder ao equivalente a 500 mg de cloridrato de metformina e 5 mg de glibenclamida por dia a cada 2 semanas ou mais, até o alcance da dose mínima eficaz para um controle adequado da glicemia. *Em substituição ao tratamento anterior com medicamentos antidiabéticos à base de metformina e glibenclamida:* O aumento da dose não deve exceder 500 mg de cloridrato de metformina e 5 mg de glibenclamida por dia a cada 2 semanas ou mais, até o alcance da dose mínima eficaz para controle adequado da glicemia. *Dose máxima:* 2.000 mg/20 mg por dia.

Reações adversas - No início do tratamento pode provocar alterações da visão, devido a um nível mais baixo de açúcar no sangue; contudo, esta reação costuma desaparecer após algum tempo. Hipoglicemia.

Apresentações - GLIBETA 500 mg + 2,5 mg: Embalagem contendo 10 ou 30 comprimidos revestidos. GLIBETA 500 mg + 5 mg: Embalagem contendo 10 ou 30 comprimidos revestidos.

Registro no M.S. 1.0525.0033.

TORRENT do Brasil Ltda.